摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十三

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書蒼要

御纂醫宗金鑑卷六十三

編緝外科心法要訣目録



會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽
勇疽
鬢疽
天疽銳毒
耳後疽
耳發
耳根毒
玉枕疽

腦後發
腦鑠
油風
白屑風
禿瘡
螻蛄癰
髮際瘡
面部

顴瘍
顴疽
顴疔
面發毒
面遊風
疹腮
頰瘍
骨槽風

發頤
時毒
鳳眥疽
眥心疽
龍泉疽
虎髭毒
燕窩瘡
雀斑

黑痣
黧黑皯黯

欽定四庫全書卷一萬五百十七子部

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣

百會疽圖

頭部

百會疽

百會疽在巔頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽虛温補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絶

註此百會疽又名玉頂發生在巔頂正中屬督脈經百會穴由膏粱太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖

紅腫熾熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦脣焦便秘煩躁脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲以清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬癰痛根散惡寒便溏脈見細數者此屬陽虛宜服十全大補湯以温補之外敷回陽玉龍膏若面赤過煩口乾不渴脣潤者此屬陽虛浮泛宜服桂附地黃丸引火歸源更用生附子餅置兩足心湧泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀

膏已潰糝黃靈藥太乙膏蓋貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木二分　甘草三分

陳皮二分　桔梗五分

黃芩五分　黃檗五分

人參三分　蒙本五分

防已五分　防風四分
知母四分　羌活一分
獨活四分　連翹四分
黃連一錢　生地黃四分
黃耆二錢　澤瀉二分
當歸尾四分

水煎食遠温服

方歌黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳



皮桔苓蘖人參藁二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒凉

冲和膏

回陽玉龍膏 俱見腫瘍門

生肌散

十全大補湯

黃靈藥

太乙膏 俱見潰瘍門

桂附地黃丸

附子餅見前灸法

琥珀膏見後髮際瘡

透腦侵腦疽圖



透腦疽生在百會穴前顖會穴前

侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

透腦疽

透腦疽生百會前形如鷄子痛而堅輭漫膿稀虛塌陷紅硬膿稠實腫尖

註此證生於百會穴之前顖門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如鷄子堅硬疼痛瘡頂塌陷根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者順遲潰透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽

侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫逆要審詳

註此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起熻熱疼痛膿色如蒼蠟者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根腳散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服荊防敗毒散汗之次服內疎黃連湯下之將潰服托裏透膿湯已潰

服托裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘内
外治法俱按癰疽潰瘍門

托裏透膿湯

人參　白朮土炒　白芷各一錢
穿山甲炒研　白芷各一錢
升麻　甘草節各五分
當歸二錢　生黃耆三錢
皂角刺一錢五分　青皮五分炒

水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服

方歌 托裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲芷升麻草當歸黃耆刺青皮

荊防敗毒散 見項部腦疽

內疎黃連湯

冲和膏 俱見腫瘍門

托裏排膿湯見項部魚尾毒

琥珀膏見髮際瘡內

佛頂疽圖

佛頂疽生在透腦疽之前上星穴

佛頂疽

佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛黑陷必然凶

註此證一名頂門疽生於頭頂顖門之前屬督脈經上星穴由藏府陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫痛脈洪大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若潰爛黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治法俱按百會疽

額疽圖

額疽

額疽生額火毒成左右膀胱正督經頂陷焦紫無膿重高聳根收紅腫輕

註此證生前額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕而屬順也初服荊防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服托裏

透膿湯氣實者宜服透膿散外敷冲和膏已潰宜服托裏排膿湯外貼琥珀膏其餘内外治法俱按

癰疽潰瘍門

荆防敗毒散見項部腦疽

仙方活命飲見腫瘍門

托裏透膿湯見前侵腦疽

托膿散

冲和膏俱見腫瘍門

托裏排膿湯見項部魚尾毒

琥珀膏見髮際瘡内

勇疽圖

勇疽生在眼角後五分童子髎穴又名太陽穴

勇疽

勇疽背後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼黃膿為吉黑為凶

註此證一名勇疽又名腦發疽屬足少陽膽經怒火而成生於目小背之後五分生在太陽穴者無論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日信膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒從膿解為順易治若出紫黑血

者係氣虛不能化毒為逆難治初服仙方活命飲清解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷二味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲

內疎黃連湯

二味拔毒散俱見腫瘍門

鬢疽圖



鬢疽生在左右鬢角

鬚疽

鬚疽三焦膽二經證由慾怒火凝成此經氣多而血少潰腐惟宜少見膿

註此證發於鬚角屬手少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾念火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬚角肌肉薄不宜鍼灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝

湯解之膿成者宜托裏消毒散托之外敷二味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡　生地各一錢五分

當歸二錢　赤芍一錢五分

川芎一錢　連翹二錢去心

牛蒡子一錢五分炒研　黃芩一錢

生梔子研　天花粉

甘草節　防風　各一錢

水二鍾煎八分食遠服

方歌柴胡清肝治怒證宣血疎通解毒良四物生用柴翹蒡黃芩梔粉草節防

托裏消毒散

二味拔毒散俱見腫瘍門

天疽銳毒圖



天疽　銳毒

天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救

註此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疹痛倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀

慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險症急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任衄內薰肝肺惡證悉添必致不救若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應證亦止十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜服托裏消毒散虛者十全大補湯托補之外俱敷烏龍膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門淵液瞻經穴名

柴胡清肝湯見前鬚疽

托裏消毒散

烏龍膏俱見腫瘍門

十全大補湯見潰瘍門

耳後疽圖

耳後疽生耳上稍之後角孫穴開口有空陷下之處左右相同

耳後疽

耳後疽生耳摺間三焦風毒膽火炎紅腫有頭爛為順黑陷磬痛冷潰難

註此證生於耳摺之間無論左右屬三焦經風毒兼膽經怒火上炎而成初起如粟漸增腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭爛熱易潰稠膿者為順若黑陷堅硬磬痛引腦甚則項頰肩肘俱痛不熱遲潰紫血者為逆初治法同天疽已潰內外治法

俱按癰疽潰瘍門又有初起失於托裏或誤食寒涼則毒不能外發遂攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者其愈最緩老年得此證者易於成漏

十全大補湯見潰瘍門

耳發圖

耳發

耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬吉紫血凶

註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔爛赤疼痛腫連耳輪蓋發者乃癰症之毒甚者也不可聽其自潰恐潰遲膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜

服仙方活命飲消之外敷二味拔毒散其餘内外治法俱按癰疽瘡潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

二味拔毒散見腫瘍門

耳根毒圖

耳根毒生在耳垂後偏上縫中左右相同

耳根毒

耳根毒初瘰核形腫如伏鼠嫩赤疼三焦風火膽怒氣暴腫潰速非疽癰

註此證生於耳後初起形如瘰核漸增腫勢狀如伏鼠嫩赤疼痛由三焦風火膽經怒氣上沖凝結而成但此證暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢大毒甚也初起寒熱往來宜服荆防敗毒散汗之發熱痛甚者仙方活命飲消之膿成者服透膿散虛

者服托裏透膿湯潰後外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡模搽生肌玉紅膏生肌斂口若遇虛者膿水清稀或瘡口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

仙方活命飲見腫瘍門

荆防敗毒散見項部腦疽

透膿散見腫瘍門

托裏透膿湯見前侵腦疽

紅靈藥

生肌玉紅膏

太乙膏俱見潰瘍門

香貝養榮湯見項部石疽

玉枕疽圖



玉枕疽生腦後玉枕骨矣上腦戶穴在百會穴之後四寸半

玉枕疽

玉枕疽屬督衄經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高腫為順紫陷凶

註此證由督衄經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨夾微上腦戶穴初起如粟麻癢相兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄小如鴈卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血水者屬凶險也初則俱服神授衛生湯消解之

虛者宜服托裏消毒散外敷冲和膏其餘内外治法俱按癰疽腫潰瘍門

神授衛生湯

托裏消毒散

冲和膏俱見腫瘍門

腦後發圖



腦後發

腦後發生在督經熱結風府粟腫疼紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水凹

註此證屬督衝脈經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米漸腫作疼痛引頭項肩項氣粗鼻塞漸大如盤如盌紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時津血水者逆初起內外治法按玉枕疽其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

腦鑠圖

腦鑠

腦鑠項後如橫木精涸毒火上乘生黑如龜烟牛唇硬木痛未腐水流清急施桑艾法至痛火燎刺痛屬陽經速服仙方活命飲若見七惡定然凶

註此證生於督脈經風府穴由陰精枯涸毒火乘之而生初起形如椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎色如龜烟硬若牛唇未膿皮先腐爛時流清水肌肉氷冷輕者木痛重者毒氣

將陷全不知疼宜急施桑柴烘法或艾灼灸法以痛為度速服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽證速服黃連消毒飲外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法

艾灶灸法 俱見首卷

仙方活命飲 見腫瘍門

十全大補湯 見潰瘍門

黃連消毒飲 見前百會疽

回陽玉龍膏 見腫瘍門

油風圖

油風生頭髮內毛髮脫落成片皮膚色紅光亮甚癢亦生鬚眉間及面部

油風

油風毛髮乾焦脫皮紅光亮癢難堪毛孔風襲致傷血養真海艾砭血痊

註此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養毛髮宜服神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若躭延年久宜鍼砭其光亮之處出紫血毛髮庶可復生

神應養真丹

羌活　木瓜

天麻　白芍

當歸　菟絲子

熟地　酒蒸搗膏　川芎

等分為末入地黃膏加蜜丸桐子大每服百丸温

煮酒或鹽湯任下

方歌　神應養真治油風養血消風髮復生羌歸木瓜天

麻芍菟絲熟地與川芎

海艾湯

海艾　菊花

蒺本　蔓荊子

防風　薄荷

荆穗　藿香

甘松各二錢

水五六碗同藥煎數滾連湯共入殿口鉢内先將

熱氣薰面候湯少温用布蘸洗日洗二三次洗後避風忌魚腥發物

方歌海艾湯治油風癢先薰後洗善消風菊蒙蔓荊風薄穗藿香海艾與甘松

白屑風圖



白屑風生於頭面作癢搔起白屑皮脫去又起其燥癢倍增

白屑風

白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌醫此患

註此證初生髮內延及面目耳項燥癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風風邪侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥烈者用潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸

大胡麻　蒼术炒
牛膝酒洗　石菖蒲
苦參　何首烏
花粉　葳靈仙各二兩
當歸身　川芎
甘草各一兩生

右為細末陳煮酒跌丸菉豆大每服二錢白滾水送下忌魚腥發物火酒

方歌換肌丸治白屑風燥癢日增若蟲行風燥血分失潤養疊起白屑落復生歸芎胡麻蒼朮膝菖蒲花粉草葳靈苦參何首烏為末煮酒跌丸菉豆形

潤肌膏

香油四兩　奶酥油二兩

當歸五錢　紫草一錢

將當歸紫草入二油內浸二日文火熬焦去渣加黃蠟五錢溶化盡用布濾傾盤內不時用柳枝攪

冷成膏每用少許日擦二次

方歌 潤肌膏擦白屑風肌膚燥癢用更靈酥香二油歸

紫草蝶焦加蠟濾攪凝

禿瘡圖

禿瘡生於頭皮騷癢撓破津水結白膿痂多生小兒頭上

禿瘡

禿瘡風熱化生蟲騷癢難堪却不疼白痂如錢生髮內宜服通聖搽膏靈

註此證頭生白痂小者如豆大者如錢俗名錢癬又名肥瘡多生小兒頭上騷癢難堪却不疼痛日久延漫成片髮焦脫落即成禿瘡又名癩頭瘡由胃經積熱生風而成宜用防風通聖散料醇酒浸焙為細末每服一錢或二錢量其壯弱用之食後白

滾湯調下服至頭上多汗為驗初起肥瘡宜擦肥油膏用久則效已成禿瘡者先宜艾葉鴿糞煎湯洗淨瘡痂再用豬肉湯洗之隨擦躑躅花油以殺蟲散風蟲死則瘡止風散則髮生血潮則肌膚潤

久擦甚效

防風通聖散

防風　當歸

白芍　酒炒　芒消

大黃　連翹

桔梗　川芎

石膏煅　黃芩

薄荷　麻黃

滑石各一兩　荊芥

白朮土炒　山梔子各二錢五分

甘草二兩生

共為末

方歌防風通聖治禿瘡胃經積食致風傷連翹梔子麻黃桔白术歸芍滑石防黃芩甘草石膏芍薄荷荊芥並消黃共末酒拌晒乾碾白湯調服發汗良

肥油膏

番木鱉六錢　當歸

藜蘆各五錢　黃蘗

苦參　杏仁

狼毒　白附子各三錢

鯉魚膽 二個

用香油十兩將前藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布濾過罐收每用少許用藍布裹於手指蘸油擦瘡

方歌肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮强黃蘗苦參白附子番鱉狼毒杏仁良蔡蘆當歸鯉魚膽煠焦入蠟實奇方

躑躅花油方

躑躅花根四兩搗爛用菜油一盌煠枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次氊帽戴之勿令見風

方歌躑躅花油療禿瘡驅蟲止癢擦之良躑躅花根研極爛菜油煠枯入蠟强

螻蛄癤圖

蝼蛄癤

蝼蛄癤即蟺拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多衣膜暑熱形大功易收

註此證多生小兒頭上俗名貉猫未破如曲蟺拱頭破後形似蝼蛄串穴有因胎中受毒者其瘡腫勢雖小而根則堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂宜用三品一條鎗插於孔内化盡堅硬衣膜

換撒生肌散貼玉紅膏以收斂之不致再發也亦有暑熱成毒者大如梅李相聯三五枚潰破膿出其口不斂日久頭皮串空亦如螻蛄串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作瘡抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條鎗

白矾一兩五錢　明礬三兩

矾礬二味共研細末入小罐內加炭火煆紅青烟已盡疊起白烟片時約上下紅徹住火取罐安地上一宿取出約有矾礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搓成線條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用鍼通孔竅早晚插藥二條插至三日後孔大者每插十餘條插至

七日孔內藥條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日前後其堅硬衣膜及疔核瘰癧痔漏諸管自然落下隨用湯洗搽玉紅膏虛者兼服健脾補劑自然收斂

方神奇三品一條鎗能醫堅硬衣膜瘡雄乳白矾礬生用研末煆煉搽條良

敗銅散

化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能滲濕

祛癢瘡口易歛

方歌 敗銅散治潰風傷騷癢破津脂水瘡化銅舊罐研細末香油調敷滲濕良

紺珠膏

萬應膏

生肌散

紅玉膏 俱見潰瘍門

髮際瘡圖

髮際瘡

髮際瘡生髮際邊形如黍豆癢疼堅頂白肉赤初易治胖人肌厚最纏綿

註　此證生項後髮際形如黍豆頂白肉赤堅硬痛如錐刺癢如火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成也初宜紺珠丹汗之次用酒製防風通聖散清解之外搽黃連膏效惟胖人項後髮際肉厚而多摺紋其髮反刺瘡內

因循日久不瘥又兼受風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

琥珀膏

定粉一兩　血餘八錢

輕粉四錢　銀朱七錢

花椒十四粒　黃蠟四兩

琥珀五分末　麻油十二兩

將血餘花椒麻油煠焦撈去渣下黃蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁盆內預將定粉銀朱輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐徐下入油內用柳枝不時攪之以冷為度綿燕脂攤貼紅綿紙攤貼亦可

方歌琥珀膏能治諸瘡活瘀解毒化腐良定血輕朱椒蠟珀麻油熬膏亦療瘍

紺珠丹　即萬靈丹見腫瘍門

防風通聖散見前禿瘡

黃連膏見鼻部鼻瘡

頭風傷目

頭風引目眥稜痛風火寒痰有四因或由楊梅攻毒頂或因產後被風侵

註此證畏寒惡風其痛走注不定得煖少減者風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青脣白氣逆不渴小水白者寒痛也身重肢

痰胸煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證舊有古方羌活冲和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉稜痰痛眼皮跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛多致損目若只眉稜痰痛以碧雲散常吸之甚效

羌活冲和湯

防風　白芷　各一錢

細辛　甘草　各五分生

生地　蒼术
黃芩各一錢　羌活一錢五分
川芎二錢
引加葱頭三根生薑一片紅棗肉二枚水煎食遠
服
痛由頂後起屬膀胱經倍羌活加藁本
痛由耳後起屬膽經加柴胡
痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷加葛根

煆石膏

頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼术

頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減黃芩

頭痛兼有嘔涎沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸

頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏

便秘者加生大黃

頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏

方歌冲和頭風風傷目風火寒痰四因生日久眉稜痠痛跳遮睛損目此能清防風白芷細辛草生地蒼芩羌活芎詳在隨加引經藥葱薑紅棗水煎成

碧雲散

川芎　鵞不食草各一兩

細辛　辛夷各二錢

青黛一錢

共為細末患者口噙涼水令人以蘆筒吹入左右

鼻孔內取嚏為效每用少許鼻常吸之其效緩

方歌碧雲散去頭風證眉稜痠痛更堪醫我鳶不食草辛夷黨芎細同研不時吸

貼兩太陽穴法　治頭痛如破

雀腦川芎　白附子　各等分

研末葱汁調稠紙攤貼左右太陽穴效

產後風寒侵腦頭痛不可發汗宜用四物湯倍川芎加荊芥穗服之其效緩

楊梅毒入腦髓以致頭痛者治在本門

四物湯見瘍門

癰瘍癰疽圖

面部

顴瘍顴疽

顴瘍顴疽漸椹形風熱積熱小腸經瘍起焮紅浮腫痛疽紫漫硬木麻疼

註此二證發於顴骨尖處屬小腸經不論左右初小漸大如椹發陽分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰名為顴瘍毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方

潰名為顴疽毒甚根深難愈瘍證初宜仙方活命飲疽證初宜內疎黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲

內疎黃連湯

麥靈丹俱見腫瘍門

癰疔圖



癰疔已赤堅硬形小根深左右相同

顴疔

顴疔初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深固寒熱交作麻癢疼

註此證生在顴骨之間屬陽明胃經不論左右初如粟米黃色小皰次如赤豆頂凹堅硬按似疔頭麻癢疼痛多因過食炙煿藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次服黃連消毒飲清之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺

即當急治遲則毒火攻心令人昏憒譫語惡證悉
添多致不救

蟾酥丸見疔瘡門

麥靈丹見腫瘍門

黃連消毒飲見頭部百會疽

面發毒圖

面發毒

面發毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬燃疼津黃水證屬風熱客陽明

註此證生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅燃痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服荊防敗毒散汗之若胃火盛則唇焦口渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

涼膈散

黃芩　薄荷

梔子生研　連翹去心

石膏生　甘草生

芒消　大黃各等分

水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙和服

方歌涼膈散醫肺胃熱口渴唇焦便燥結芩薄梔翹石膏草芒硝大黃苦竹葉

清涼消毒散

白及　乳香

雄黃　天花粉

麝香　烏藥

山慈菇　黃蘗

各等分共研細末鷄子清和蜜水調敷

方歌

清涼消毒去風熱及乳雄黃花粉麝烏藥慈菇黃

蘗研鷄清蜜調毒即滅

荊防敗毒散 見頂部腦疽

面遊風圖

面游風

面遊風燥熱濕成面目浮腫瘡蟲行膚起白屑而瘡極破津黃水津血疼

註此證生於面上初發面目浮腫瘡若蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極瘡抓破熱濕盛者津黃水風燥盛者津血痛楚難堪由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而成瘡甚者宜服消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外抹摩風膏緩緩

取效

摩風膏

麻黃五錢　羌活一兩

白檀香一錢　升麻二錢

白及一錢　防風二錢

當歸身一錢

用香油五兩將藥浸五日文火煠黃即撈去渣加黃蠟五錢溶化盡用絹濾過攪冷塗抹瘡上

方歌摩風膏抹遊風證麻黃羌活白檀升及防歸身香油泡煠黃去渣加蠟凝

消風散見項部鈕口風

黃連消毒飲見頭部百會疽

疳腮圖

疰腮

疰腮胃熱是其端初起焮痛熱復寒高腫焮紅風與熱平腫色淡熱濕原

註此證一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不着骨之處無論左右總發端於陽明胃熱也初起焮痛寒熱往來若高腫色紅焮熱者係胃經風熱所發若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宜四順清涼飲

解之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜托裏
消毒散托之膿熟者鍼之體虛者宜平補之其餘
治法按癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥令毒
攻喉者險

柴胡葛根湯

柴胡　葛根
石膏煅　花粉
黃芩各一錢　甘草五分生

牛蒡子炒研　連翹去心

桔梗各一錢　升麻三分

水二鍾煎八分不拘時服

方歌柴胡葛根發表證痄腮腫痛或平形石膏花粉黃

芩草牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲

防風　梔子生研

連翹去心　甘草生

當歸　赤芍
羌活各一錢　大黃二錢
水二鍾燈心五十寸煎八分食遠服
方歌四順清涼攻裏强口乾便秘疥腮瘡防風梔子連
翹草歸芍燈心羌大黃
托裏消毒散見腫瘍門

頰瘍圖

頰瘍

頰瘍胃經積熱生初如紅粟漸櫑形膿出腫消易斂愈膿稀難斂漏因成

註此證生於耳下頰車骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如櫑初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過數寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰宜托裏消毒散膿熟鍼之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙

關竅急不開或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉餅墊灸艾壯初用九壯以知熱瘡為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹撚入瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯

犀角二錢五分　升麻一錢七分

黃芩八分　白附子八分麪裹煨熟
生甘草五分　白芷八分
川芎八分　羌活一錢二分
防風八分

水三鍾煎一鍾食遠熱服

方歌　犀角升麻鱉頰瘍色紅初起服之良黃芩白附生甘草白芷川芎羌活防

升陽散火湯

撫芎六分　蔓荊子
白芍酒炒　防風
羌活　獨活
甘草半生半炙　人參各一錢
柴胡　香附各一錢五分
葛根一錢　升麻一錢
殭蠶一錢五分炒

生薑一片紅棗肉一枚水三鍾煎一鍾食遠温服

方歌升陽散火過數寒羌又拘急木痛堅撫蔓芍防羌
獨草參柴香附葛升蠶

托裏消毒散見腫瘍門

豆豉餅見灸法內

紅升丹

萬應膏俱見潰瘍門

骨槽風圖



骨槽風腮頰浮腫牙關緊急

骨槽風

骨槽風火三焦胃耳前腮頰隱隱疼腐潰筋骨仍硬痛牙關拘急挾邪風

註此證一名牙疳發一名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不救初

起熱不盛者內宜服清陽散火湯外以清胃散擦牙真君妙貼散敷腮如初起發表之後人壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷殭蠶下之後減大黃加生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜用中和湯托之已潰按癰疽瘡瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非殭蠶不能搜風如法治之諸證俱

減惟牙關拘急不開宜用生薑片墊灸頰車穴二七壯其穴在耳垂下五分陷中處每日灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散

薑黃　白芷

細辛　川芎

各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處

方歌清胃散擦牙腫疼薑黃白芷細辛芎同研先以鹽湯漱後擦此藥有奇功

中和湯

白芷　桔梗

人參　黃耆各一錢

藿香五分　肉桂五分

甘草　白朮土炒
川芎　當歸
白芍各一錢酒炒　麥門冬五分去心

水二鍾薑三片棗二枚煎八分加酒一杯食遠服

方歌中和湯治骨槽風日久不消欲潰膿芷桔參耆藿
桂草朮芎歸芍麥門冬

理中湯見潰瘍門

真君妙貼散見腫瘍門

升陽散火湯方見頰痛

發頤圖

發頤

發頤腫痛結核般經屬陽明身熱寒傷寒疹毒汗失表腫至咽喉調治難

註　此證又名汗毒發於頤頷之間屬足陽明胃經初起身發寒熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李疼痛倍增由傷寒發汗未盡或疹形未透壅積而成初起宜荆防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必潰膿宜服

托裏透膿湯潰後按癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼尅伐之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣堵湯水難嚥者逆

荊防敗毒散 見項部腦疽

二味拔毒散 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

時毒圖



時毒在於項頷之間左右同

時毒

時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感四時不正氣治分壯弱疎解痊

註此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠疼或兼咽痛一二日間發於項腮頷頤作腫無頭漸漸赤疼痛或似結核有根漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後之頤毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實

治法須宜疎解不可驟用寒凉致毒不外發而內攻咽喉者險矣初服荊防敗毒散汗之其腫不消者宜服連翹消毒飲腫仍不消膿勢將成壯者宜服透膿散弱者宜服托裏透膿湯外敷二味拔毒散膿熟鍼之潰按癰疽潰瘍門治法

散防敗毒散 見項部腦疽

連翹消毒飲 見背部酒毒發

透膿散 見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

二味拔毒散見腫瘍門

鳳眉疽圖

鳳眉疽生眉棱骨左右同

鳳眢疽

鳳眢疽生兩眢稜形長如瓜漫腫紅膀胱小腸肝膽熱煩悶嘔逆不食凶

註此證亦名眢發生於眢稜無論左右俱屬足太陽膀胱手太陽小腸足厥陰肝足少陽膽四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合腫堅硬色赤按之有根六日內刺之得膿則吉無膿則險甚則十四日不潰煩悶嘔逆不食者凶初宜服仙方活命

飲次服托裏透膿湯速潰為妙遲則恐攻眼損睛矣其餘内外治法按癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

眉心疽圖

眷心疽

眷心疽生在印堂硬腫為疽浮腫瘍楯經風熱氣凝滯根堅木痛當疔防

註　此證生於兩眷中間疽名曰印堂疽毒初起色暗根平腫硬疼痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆瘍名曰面風毒瘍毒初起色赤浮腫煩痛易治七日潰膿若色黑木痛麻癢太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作即眷心疔也俱由楯脈經

風熱壅結氣滯所成疽瘍二證俱按百會疽習心疔治法同疔

龍泉疽圖

龍泉疽

龍泉疽起在人中麻癢堅疼赤豆形上焦風熱攻督脈憎寒壯熱治同疔

註此證生於水溝穴即人中是也屬督脈經形如赤豆勢小根深堅硬木痛色紫頂焦寒熱交作不時麻癢由上焦風熱攻於督脈而成宜按疔門急速治之遲則毒氣內攻令人煩悶惡心乾嘔神亂昏憒腮項俱腫多致不救

虎鬚毒圖



虎鬚毒在下脣之下宛宛中

虎髭毒

虎髭毒在頦下生胃腎積熱入任經癰焃腫痛速潰易疽堅硬痛麻癢疔

註此毒一名頦癰腫痛焃赤速潰易治一名承漿疽堅硬痛腫遲潰難治若根深形小似豆麻癢痛甚惡寒發熱心煩作嘔者疔也當從疔治皆由過食炙煿以致胃腎二經積熱上攻任脈而成癰疽二證初起宜服仙方活命飲加升麻桔梗消之若便

秘膚焦大渴者宜內疎黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門初起麻癢如疔治法按疔門

仙方活命飲

內疎黃連湯 俱見腫瘍門

燕窩瘡圖

燕窩瘡生於下頦

燕窩瘡

燕窩瘡在下頦生如攢粟豆癢熱疼形類黃水瘡破爛此證原來濕熱成

註此證生於頦下俗名羊鬍子瘡初生小者如粟大者如豆色紅熱癢微痛破津黃水形類黃水瘡浸淫成片但疙瘩如攢由脾胃濕熱而成宜服苓連平胃湯外搽碧玉散即效

苓連平胃湯

黃芩一錢五分　黃連一錢
厚朴一錢薑炒　蒼术二錢炒
甘草五分生　陳皮一錢

水二鍾薑一片煎八分食後服

方歌芩連平胃燕窩瘡除濕清熱服更良薑炒厚朴蒼术草陳皮同煎引生薑

碧玉散

黃檗末　紅棗肉各五錢燒灰存性

共研極細末香油調搽患處

方歌碧玉散搽燕窩瘡色紅疙瘩津水黃柬炭蘗末香油拌消疼止癢滲濕方

雀斑圖

雀斑

雀斑

雀斑淡黃碎點形火鬱孫絡血風成犀角升麻丸常服正容散洗漸無蹤

註此證生於面上其色淡黃碎點無數由火鬱於孫絡之血分風邪外搏發為雀斑宜常服犀角升麻丸並治一切粉刺酒刺黯黮齄子等證外用時珍正容散早晚洗之以澤其肌久久自愈亦有水虧火滯而生雀斑者宜服六味地黃丸

犀角升麻湯

犀角一兩五錢　升麻一兩

羌活一兩　防風一兩

白附子五錢　白芷五錢

生地黃一兩　川芎五錢

紅花五錢　黃芩五錢

甘草二錢五分
生

各為細末合均蒸餅為小丸每服二錢食遠臨卧

用茶清送下

方歌　犀角升麻治雀斑黥黷靨子亦能痊犀升羌防白附芷生地芎紅芩草丸

時珍正容散

猪牙皂角　紫背浮萍

白梅肉　甜櫻桃枝各一兩

焙乾兌鷹糞白三錢共研為末每早晚用少許在手心内水調濃搓面上良久以温水洗面用至七

八日後其斑皆没神效

方歌正容散洗雀斑容猪牙皂角紫浮萍白梅櫻桃枝

鷹糞研末早晚水洗靈

六味地黃丸

懷熟地八兩　山萸肉

懷山藥各四兩炒　白茯苓

丹皮　澤瀉各三兩

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢空心

淡鹽湯送下

方歌六味地黃善補陰能滋腎水並生津萸芩山藥丹皮瀉研末蜜丸服最神

黑痣圖

黑子痣生於面部

黑痣

黑痣生面徹點斑小如黍粒豆形圓孫絡之血陽束結挑破水晶膏點痊

註　此證生於面部形如徹點小者如黍大者如豆比皮膚高起一線有自幼生者亦有中年生者由孫絡之血滯於衛分陽氣束結而成宜用線鍼挑破以水晶膏點之三四日結痂其痣自落用貝葉膏貼之兼戒醬醋葱後無痕

水晶膏

礦子石灰水化開取末五錢又用濃鹽水多半茶鍾浸於石灰末內以鹽水高石灰二指為度再以糯米五十粒撒於灰上如鹽水滲下陸續添之泡一日一夜冬天兩日一夜將米取出搗爛成膏挑少許點於瘡上不可太過恐傷好肉

方歌水晶膏能點黑瘡鹽水浸灰入糯米一日一夜米泡紅取出搗膏效無比

貝葉膏見潰瘍門

黧黑斑黯

好黯如塵久始暗原於憂思抑鬱成大如蓮子小赤豆玉容久洗自然平

註此證一名黧黑斑初起色如塵垢日久黑似煤形枯暗不澤大小不一小者如粟粒赤豆大者似蓮子艾實或長或斜或圓與皮膚相平由憂思抑鬱血弱不華火燥結滯而生於面上婦女多有之宜

以玉容散早晚洗之常用美玉磨之久久漸退而愈戒憂思傷勞忌動火之物

玉容散

白牽牛　團粉

白斂　白細辛

甘松　白鴿糞

白及　白蓮蕊

白芷　白朮

白殭蠶　白茯苓各一兩

荆芥　獨活

羌活各五錢　白附子

鷹條白　白扁豆各一兩

防風五錢　白丁香一兩

共研末每用少許放手心内以水調濃搽搓面上良久再以水洗面早晚日用二次

方歌　玉容散退黧皯黯牽牛團粉歛細辛甘松鴿糞及

蓮蕊芷术殭蠶白茯苓羌芥獨羌白附子鷹條白
扁豆防風白丁香共研為末早晚洗面去斑容

御纂醫宗金鑑卷六十三



總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣莫瞻菉
謄録監生臣平　達
繪圖監生臣寶光國