衛生家寶產科備要

產科雜方

催生如聖散此壹方廬江劉寶助教經效名方

黃蜀葵花不拘多少

右壹味焙乾爲細末每服貳錢熟湯放温調下神妙或有漏血胎臟乾澁難產痛劇者併進叁服良久腹中氣覓胎滑即時產下如無花只用黃蜀

葵子爛研小半合以酒調濾去滓温
飲尤佳

救生散安胎益氣易産

人參去蘆切片　訶子濕紙裹煨熟去核　白朮劉炒黃　陳橘皮去白炒
大麥蘗炒黃　神麴細劉炒黃色　各半兩

右爲細末每服貳錢水壹盞煎陸分
温服入月加壹倍用水貳盞煎壹盞
温温空心服之能令兒緊小乳母無患

單胎散治婦人姙娠傷寒遍身大熱悶亂躁渴痰甚則蒸損胎臟廬江劉寶助教名方

捲荷葉壹兩嫩者焙乾秤

蚌粉花半兩好細白者秤

右爲細末入粉研勻每服貳錢以新汲水用蜜調下日進兩服

二聖散產前安胎產後治惡血不盡及胎衣不下

羌活洗去苗剉　川芎洗剉

右等分爲細末每服貳大錢酒少許水柒分煎柒沸温服

羌活散治姙娠患時疾

羌活去苗剉碎　荆芥穗不見火熬

赤茯苓去皮剉碎　川芎洗剉焙

宣州乾葛剉焙　陳皮去穰剉

甘草炙剉　川升麻剉　各壹兩

右爲細末每服叁錢水壹盞半入生

薑伍片薄荷拾葉同煎至壹盞稍熱服不以時候

黃金散治妊娠患時疾

黃芩（火如雞者）鬱金（劉各）壹兩

右爲末每服壹錢板藍根地黃水調下汗出效未得汗再服即瘥又用鷄卵墜井至泥隔宿取出吞之必無虞矣

薑粉散繞產服此藥蕩盡兒枕除百病源

當歸 洗去蘆須切焙

人參 去蘆切片

甘草 炙

知母 潤者切炒

大黃 略炒

木香 不見火

白朮 剉焙

高良薑 剉炒

熟乾地黃 洗酒浸焙

官桂 去皮不見火

茯苓 白者去黑皮

芍藥 洗淨

川芎 洗

黃耆 蜜炙

草豆蔻 去殼

訶子 煨熟去核

青橘皮 去瓤

右除地黃外各等分剉焙乾次用附子壹箇結實半兩者炮裂去皮臍切生薑壹斤研取自然汁於椀器中停留壹食久傾去清汁取下面粉脚攤在葛葉中入焙籠焙乾同衆藥擣羅爲末繞產後用藥末叁錢水壹盞薑叁片棗子壹箇擘開同煎至六分乘熱喫如喫藥之後自然產母睡着半日以來睡覺再服全除却腹痛壹日

只可參服至玖服不可服恐肚中冷也

香蓮散治產後咳嗽

石蓮拾箇（炒熟）丁香拾箇

右爲末用水參合煎拾沸溫服

地黃散治產後血痛如刀刺

熟乾地黃（洗酒浸焙）橘皮（去白劉焙）

右件等分爲末每服壹錢粥飲調下

尋常痛發可常服

香脂散治產後吐噦不止

狗膽壹箇　研砂
丁香　五靈脂各少許
右爲末以狗膽圓如白豆大每服壹
圓生薑水磨下
血竭散治産後百疾盧江劉寶助教
名方
血竭　沒藥　剪碎
右等分輕手研細頻羅再研取盡爲
度每服貳錢用小便合和細酒半大

盞煎壹貳沸温調下纔産下壹服上
床良久再服其惡血自循下行更不
衝上免生百疾
産後發熱名曰褥勞用猪腰子作粥治之
猪腰子壹隻去白膜薄切作枾葉片子
少鹽酒拌之先用粳米壹合入葱椒煮
粥鹽醋調和將腰子鋪椀底用熱粥蓋
之如作盦生粥狀喫之每日空心做喫
極妙

十八論中治產前後患蒲黃黑神
散功効
第一產因熱疾胎死腹中胎死身即冷
口角沫出爪甲青黑色四肢逆冷但
服此藥煖其死胎須臾自出
第二難產或橫生逆生胎衣不下此藥
並治
第三產後衣不下但服此藥逐出衣中
血遂自出如衣帶斷亦同

第四血暈醫人不識呼爲腦風但服此藥立瘥

第五口乾心悶醫人呼爲胸膈不利此名血結但服此藥立瘥

第六乍寒乍熱醫人不識呼爲瘧疾但服此藥立瘥

第七産後四肢虛腫醫人不識呼爲水氣蓋血氣關四肢寒但先服此藥立瘥後服轉藥瀉了惡物轉藥謂之黑

神圓

第八產後乍見神鬼醫人不識呼爲風邪但服此藥即瘥

第九產後月內不語但服此藥即瘥

第十產後腹痛兼瀉痢急服此藥後服調中湯 調中湯是止瀉石灰散出產乳經中

第十一產後遍身疼痛但服此藥瘥

第十二產後小便出血大便祕澁人多作五淋治不愈但服此藥瘥

第十三產後血崩謂惡露未盡又不治之及食鹹酸所致若腹似痛時稍難治肝家熱皆筋急急服此藥後服黑神圓瘡

第十四產後血氣不通上氣喘嗽多睡謂滿月後月脉未通食熱麵壅結成疾或有氣塊發時衝心心痛氣急咳嗽四肢無力乍汗出心痛月候不來名曰敗癥腹痛遶臍面赤宜服此藥

即薨

第十五產後心腹脹滿嘔逆不定醫呼爲飜胃不愈急服此藥吐出胃中惡物即薨

第十六產後口鼻黑色氣起及鼻衄不治

第十七產後唉中氣急喘不治

第十八產後中風爲無故下床百日之內傷房室或因著炙有驚臟腑中風之

時眼澁腰背筋急角弓反張牙關閉
定不可治也
蒲黃黑神散方已見第一論末
黑神圓方已見第十二論末
產前後十八論烏金散
婦人萬病皆因血氣而生就中產後乖
違誠難救療百日之內變證尤多或坐
即運絶卧即口乾經日多言還應心悶
或傷熱食變作崩中飲冷服凉便成腰

痛敗血入腹則脅脹虛鳴惡露上衝乃成嘔噦脾之受血發則傷寒肝氣有邪即多嗔怒肺之被撓氣悶喘籠胃藏未安多爲腹脹敗血流走百節酸疼留滯四肢皮膚俱腫失音不語還因敗血入心散爲淋瀝亦是血之入腹大抵虛弱積血所爲三焦不調衆疾皆起每尋方卷多不會解就中産前産後之圖難全真訣當貧困之輩或居村中念其急難

方當思慮竟勞神悶不知所裁忽見一人
形皃非常乃言曰余有秘術子其知乎
不覺惕然瞻敬之際復曰子請存於誠
信心欲救人事當甚喜吾有產後一術
名曰烏金方受於子宜保惜之余即跪
受要旨頓覺精神爽易事理照覺在寤
中神授乃依方修合普詣神願遂成產
後十八方如後
第一論問胎死腹中者何

荅曰緣母患染熱疾經六七日間臟腑極熱蒸薰其胎是以子死何以知之身死便冷不居子宮乃墜臍下冷痛口角沫出腹冷爪甲青四肢逆冷命在須臾但以此三服令胎熱須臾自下

第二論問產難者何

荅曰兒已成形每食母之血候十月當足月血有餘乃結成塊俗呼為兒

枕子欲生時兒枕先破爲敗血散裹子身上固當難産但服此散三服敗血即散須臾自産或逆産其躰不同悉皆治之

第三論問胎衣不下者何

荅曰産訖敗血流入胞衣中被血脹固當難下但服此散衣中血散須臾自出若胞衣帶斷亦宜服此散即下

第四論問血暈産後三日起止不得眼

前自見鬼神或悶絶不識人者何

荅曰産後三日血氣未安運走五臟奔於肺上時人不識呼爲暗風以此治之萬無一瘥但服此藥立可安瘥

第五論問口乾心悶及煩渴者何

荅曰産後七日以來血氣未定蓋爲食於熱麵與血結在心即渴時人呼爲胷膈壅悶若以此治萬無一瘥但服此散立瘥

第六論問產後乍寒乍熱及渴者何
荅曰產後虛羸敗血入於肺則熱入
於脾則寒乃渴時人不識呼爲瘧疾
若以此治萬無一痊服此散立瘥
第七論問產後四肢浮腫及寒熱者何
荅曰敗血流入五臟將蒲即四肢停
留日久却還不得乃欲爲腫時人不
識呼爲水腫且如水腫與血腫不同
何以明之水氣喘而小便澁血氣渴

而四肢寒先服此散次服宣元瀉下惡物自瘥宣元是黑神圓

第八論問言語顛狂無度若見鬼神或寒熱及渴者何

荅曰產後敗血衝心心不受邪觸被敗血蒸薰心悶蒸熱煩渴至躁言語顛狂時人不識以為風及神邪所致若以此治之萬無一痊但服此散愈

第九論問產後不語者何

荅曰夫人心有七孔三毛產後敗血上行流入心孔之中被血閉之即使不語時人不先去心孔敗血其病不除但服此藥當漸語也

第十論問產後腹痛及痢者何

荅曰產後未滿月間誤飲冷水水與血相和流入大腸大腸受之血遂成痛水穀不化或泄或脹膿血不定急服此散次服調中湯立効

第十一論問產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張敗血流入四肢留滯日久不散結聚虛脹是致疼痛但服此散逐去百節間敗血須臾自愈

第十二論問產後瘀血及小便赤澁大腸痛者何

荅曰敗血流入小腸閉却水道即小便艱澁流入大腸閉却肛門是致大小便俱難醫人不識呼爲五淋治之

萬無一痊但服此散次服黑神圓聚結物出其病立愈或用洪氏方中排澼內補散依方服立効

第十三論問產後崩中者何

荅曰敗血惡露未止日久或食鹹酸之物遂變崩中血結變黑狀似鷄肝或時寒熱脊膊拘急煩悶名曰崩中宜先服此散次服黑神圓即安

第十四論問產後血氣不調道路閉塞兼咳嗽多驚者何

荅曰産後滿月後月經未還不能謹
忌好食熱麵遂即成疾積聚結塊發
即氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背
膊拘急煩躁夜夢驚悸體全無力
多汗心疼月經不來名爲血癥腹痛
多睡面色多赤因茲不療遂成骨蒸
治須子細看此疾狀或服別藥十無
一應終不得瘥只服此藥其患自退
第十五論問腹肚脹滿吐噦者何

荅曰產後敗血停於脾胃之間氣遂相衝不定即留滯嘔噦胷脇俱脹時人不識呼爲鬱胃以此治之萬無一存急服此藥吐出胃中惡物即便喫粥

第十六論問產後口鼻黑色及鼻衄者何

荅曰敗血傳入臟腑臟腑既滿衝於頭面却還不得焦乾白黑見於面色衝於鼻即鼻衄黑起緣產後虛熱

甚變成此狀若別治之萬不得一此名心肺敗血宜服此藥

第十七論問產後喘急喉中如猫兒聲者何

荅曰敗血衝入心肺氣與血併遂結爲塊入於喉中如有此狀急服此藥

第十八論問產後中風兼有黑血點者何

荅曰產後七日內下床衝風百日內傷房勞或有灸窘中風取性慢易即中

風也初中之狀氣濕腰痛筋急如角弓反張牙關緊急若有此狀即是風邪所入或面色黑遍身赤黑敗血流入臟腑臟腑皆滿流入皮膚退反不得變成血點或得此變急服此藥無有不瘥

宣經圓

巴豆拾伍粒去皮心膜用生絹袋子盛以灰汁煮十餘沸取出研紙壓油了垂研

右件先用烏金散參錢以無灰酒調似糖入瓷瓶中於重湯內熬成膏入巴豆末同和爲圓如菉豆大熟水下拾伍圓宣了冷粥補之忌毒物

烏金散

頭髮灰 男子者不須洗燒灰

鯉魚鱗 燒灰

當歸 焙去蠹須

延胡索 生用

好墨 煆過

肉桂 不見火去麁皮

麒麟竭

赤芍藥 剉　百草霜 是鍋底刮下者煤

右件玖味等分杵羅爲末每服貳錢

温酒調下又用童子小便半盞生薑

壹塊同煎調下入麝香少許更妙

産前所忌藥物盧醫周鼎集以爲歌

蚖斑水蛭地膽蟲　烏頭附子配天雄

躑躅野葛螻蛄類　烏喙側子及蚕蟲

牛黄水銀并巴豆　大戟蛇退共蜈蚣

牛膝藜蘆加薏苡　金石錫粉對雌雄

牙朴芒硝牡丹桂　蜥蝎飛生更蜃蟲
代赭蚱蟬胡粉麝　芫花薇銜草三稜
槐子牽牛并皂角　桃子蠐螬和茅根
欓根硇砂與乾漆　亭長溲疏茵草中
瞿麥蕳茹蟹爪甲　蝟皮鬼箭赤頭紅
馬刀石蠶衣魚等　半夏天南通草同
乾薑蒜鷄及鴨子　驢馬兎肉不須供
切忌婦人產前用　此歌宜記在心胷

衛生家寶產科備要卷第五

衛生家寶産科備要卷第六

備産濟用方序

婦人産褥之事亦有蹉跌爲害不細若因而受疾又非尋常疾病之比氣血既虛更難攻治是宜昔人所留意而不敢忽者也予性喜方藥偶得産方甚多蓋嘗用以取効焉今録其所得之方及平時所聞之說與夫疾證用藥次第共爲一書以濟人之急難初虞世嘗謂婦人

生産須使之自能通曉方爲盡善斯乃至論然間有素無産難之家不知出於偶然心常易之不以介意故緩急之際至於産婦已困而家人未悟者往往有之此幸其無事則可非萬全之道也紹興庚申重陽日三吳外士餘杭虞沆書

虞氏備産濟用方

妊娠

婦人妊娠之後或觸冒風冷或飲食不

節或居處失宜或勞動過當少有不和則令胎動不安重者遂致傷墮臨產之際爲患不小豈可不戒也

妊娠三箇月後或疑非胎宜服川芎散

妊娠五箇月後宜服滑胎枳殼湯

入月

入月第一日清旦先書借地法貼產婦房內北壁上須清心志誠書之更須避日遊月支諸神等

入月後每日進保生圓一服臨產五臟
不痛其子易生
凡產閣及藏衣之地並須依方位所利
鋪設產閣務要清虛仍須遮塞孔隙無
令賊風遊氣可得而入及窓壁仰泥之
類並須一一經心照管恐有顛覆種種
非意為害不小入月後須便擇好日為
之倉卒之際無緣周備也
凡合用湯藥須於未產前一月內修合

足備不可倉卒或市諸藥肆或求之醫
簉産後五臟皆虛藥貴精當恐有雜僞
反致他疾産婦服食貴在誠潔老娘須
擇溫善安詳慣熟之人其妄誕揮霍無
常者去之又有喜驚動人而收已功者
爲害尤甚不可不知也大抵有孕婦之
家選擇老娘最爲先務既得之則令與
産婦游處情熟入月則令守月不可臨
時倉卒呼喚却致誤事又老娘收生風

俗多有不同閑時宜先令詳說次第或有未便款曲與之商量不可一切任之此若選擇得人則上下安心產婦亦免憂疑省力萬倍腰生只用家中慣熟妮子爲佳若用外人亦須先審問次第然後用之亦能爲害不可不謹也

臨產

產婦覺腹痛他人切不得驚忙及亂報人知只可令一兩人老成親熟人安慰

相伴亦不得用人多不然則令產婦憂
怕氣血錯乱生理不和而起百疾
產婦腹痛時須低心忍耐不可急性懆
怒起動揮霍皆能令子失道遂致難產
產婦若只腹痛者未產若連腰痛甚者
即產候也
產婦腹痛雖甚且須令人扶持徐徐不
住行動若倦亦且扶立時時令行先脫
產婦常着衣服一件覆籠頭上待子逼

生方得蹲坐切不可蹲坐太早太早則
子在腹中轉動不得遂致難產產婦臨
產須避太歲所在不得面對太歲蹲坐
恐致憂禍深戒深戒產婦蹲坐時須要
四體平正不得稍有傾曲及強嘔氣用
力亦能令子失道致難產也
產婦未蹲坐時先須用五積散肆錢加
順元散貳錢同煎分作兩服用湯煖却
不得令冷候蹲坐時令產婦先進一服

如稍覺產遲即再進一服若一服後便產即不須再服此藥助氣催生他藥所不及吾鄉所謂沈家五積散者是也方出沈存中內翰宅昔有貧者三百一服号爲神藥余家每用之取効但性稍熱產婦素㾦熱者服之產後臟腑須微覺燥澁甚者三兩日不通切不可用利性藥但調和粥食如後說調養津液生則自然流利也

纔分挽便須急與產婦童子小便一盞温服次進勝金湯一服不可飲酒過量緣酒能引血入四肢作病兼新產後臟腑虛熱酒入腹中必致昏乱又嘗有人用醋墨此雖破血有功然亦傷肺服多則因而成嗽余見蜀醫張宗說說有用醋墨者下咽疾作此是氣血方虛酸勝而生痰不可不戒十分挽便須燒塼博石

或炭投醋中三日內嘗令聞猛醋煙氣以防血暈又不得令熟驟須頻頻喚醒緣氣血全虛恐生昏亂分娩後不得便睡且須扶坐移時方可以軟物自腰以上漸漸搘起及高枕起頭項仍須令仰卧立起膝時復令人從心上用手按到臍下如此一日已來方可止恐惡血上行而致暈也兼須加意遮避賊風不可不謹

產後所進粥藥不得犯生水以至椀器之類並須用沸湯洗火炙乾方可用產後七日內唯須頻進童子小便及時進白粥如小便難與則依法漬之自然易與也七日後方可進少醇酒并些小燒鹽不可用生鹽二七日後漸進些小淡煮熬極糜爛羸肉三七日後漸食滋味一月後漸進麵食一百日後方可食果實生冷等物產後五臟百脉率皆傷動一

百日後方始如舊常人不自愛惜才到滿月便稱平復或不謹飲食或觸冒風冷或喜怒高聲或勞動用力氣血未定情慾不常此皆致病之由也婦人禀受虛實皆緣生產而能移易若能一一如法將息補養則有平生虛怯多病而遂盛實無病者若不能如法將息補養則有平生盛實無病而遂致虛損瘦瘠成纏綿不可起之疾者當時不覺意謂不

然及歲月成疾又不能推究其由乃謂偶爾故婦人產後往往不能加意將攝噫臨產之際死生所繫及產難既過漸向平復而又不能將息以自保攝遂取困厄豈不至愚哉世之任意輕動不能調養者多故詳言之

產後諸證用藥例

產後惡露或多或少皆能令人暈悶心煩滿急

產後惡血攻心則能令人眼生黑花心悶欲絶產後才覺惡心頭旋頭昏多涕唾身如在舟車中此是血暈之候也便以猛醋煙燻及服保生圓勝金湯百草霜散等治血藥則如熟乾地黃生薑芸薹子當歸蒲黃凉沒藥桂心延胡索赤芍藥牡丹皮牛膝川芎麒麟竭之類產後惡血攻心則荒言亂語驚怕或啼或笑宜服金黃散麒麟竭散等破惡血

養好血藥則如琥珀熟乾地黃當歸蒲
黃（凉）赤芍藥之類安心氣則如遠志茯
神朱砂麝香之類
產後惡血不絶爲自來經血虛損或產
時惡血出不盡留滯腹中先有宿冷遂
成淋瀝不止宜服保生圓等如牡礪當
歸熟乾地黃艾葉阿膠厚朴乾薑之類
性冷藥不可服之
產後因惡物不下或下不盡心腹疼痛

煩悶宜服千金散血心黃散桃仁散川芎
散勝金湯保生圓竺又宜服桂心當歸
牛膝牡丹皮虎杖蓬莪茂延胡索赤芍
藥之類產後須常躰悶產婦如所下惡
物多即不須再三進逐惡血藥恐氣血
益虛煩悶暈亂及生疾病如覺比尋常
少或不行則須急攻之緣血隨氣上行
掩於心故令煩悶而心滿急二者得失
甚大切在詳審產後大腸祕澁此是產

時走津液多腸胃未和乃常事也切不可亂服通利藥但只依尋常服調氣血藥及調粥食常令温煖細軟依時漸進不得失飢亦勿傷飽氣血調和則腸胃自然平復矣

產後躰虛切不可妄進湯藥如別無證候但只與保生圓及調養氣血等藥

產後三日起坐不得眼見黑花目或暈絶全不見物者是血氣未安運走五臟

奔豚於肝故也有不識者呼爲暗風候矣宜服黑散子

產後乍寒乍熱及渴者是產後虛羸敗血入心肺則熱入脾則寒不識者呼爲瘧疾候矣宜服黑散子

產後四肢浮腫及寒熱者是產後敗血流入五臟五臟將蒲流入四肢停留日久却還不得乃化爲水有不識者呼爲水氣候矣血與水氣狀候不同何以明

之水氣喘而小便澁血氣渴而四肢沉
當細辯之宜服黑散子產後言語顛狂
乍見神鬼時復寒熱及渴者是產後敗
血衝心心不受觸既被蒸燻心臟熱極
遂生此疾不識者呼爲風邪神祟悞矣
宜服黑散子
產後一朕非時不語者是敗血上衝閉
入心孔中既被蔽之便致不語宜服黑
散子

產後遍身疼痛者是百節開張血疰結處停留不散結聚虛脹是以疼痛宜服黑散子骨間敗血即去

產後雖滿月血氣不通上氣咳嗽痰涎多者經脉未還便不忌謹多食熱麵壅結成疾聚即成塊散即上衝氣急咳嗽四肢虛熱心悶口乾睡夢多驚四肢無力盜汗心痛月候不調或成血癥環遶臍下或即面赤因變骨蒸但多服黑散

子即瘥須急服之此疾難理故也

產後敗血停在脾胃食衝於胃胃衝於氣氣衝即不安便當吐噦臍脇俱脹有不識者呼爲飜胃但服黑散子吐出惡物即瘥

產後中風者是未經七日下床兼百日內傷房事或炙瘁內中風也初中之狀眼澁腰強筋急如角弓反張牙關緊急若此之狀非中風也有此疾者安能救

療婦人傷犯之後其疾甚多不可不戒
產後面色黑及遍身生黑靨子由敗血
入皮膚欲出流走熱結便住却還不得
遂成黑靨中此者百無一瘥

難產逆產橫產

難產逆產橫產三者皆能立致不測之
禍然所得多端或先因漏胎血去臟燥
或子臟宿挾疹疾或觸犯禁忌或產時
驚動穢露下早子道乾澁產婦疲困或

坐卧未安身體斜曲不正轉動忽遽強嘔氣暴衝擊或腹有兒枕產時先破遂爲敗血散裹其子胎中伏熱故致難產也產時未至驚動太早子轉未覺便用力產之故致逆產橫產也產婦面赤舌青者子死母活面青舌赤沫出者母死子活唇口青兩邊沫出者子母俱死身更重而熱舌下脉青黑及胎上冷者子已先死並有方治之在後

胎衣不下

產婦初時用力產子而體已疲憊不能更用力產胎經停之間外冷乘之則血道乾澁胎衣不下也子臍帶與胞系相連若不下即須急治之不然則斷臍稽遲子傷冷氣而成病矣舊方胞衣不下恐損子者須依法截臍胎衣不下者腹痛蒲則殺人若倉卒無藥即多食猪肫亦佳

姙娠食忌

食兎肉令子缺脣　食雀肉令子盲
食羊肝令子多患　食鴨子令子倒生
食鱉肉令子項短　食駝肉令子過月
食乾薑蒜令胎不安　已上並姙娠五箇月之後則當忌食

入月借地法

東借十步西借十步南借十步北借十步上借十步下借十步此中產婦安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百鬼速

去急急如律令

十二月卧衣凶位
產藏吉方圖



正月丙產壬藏　二月庚甲產坤藏　三月壬產丙藏
四月庚產甲藏　五月壬產丙藏　六月甲產庚藏
七月丙產壬藏　八月甲庚產艮藏　九月丙產壬藏
十月甲產庚藏　十一月壬產壬巽藏　十二月甲產庚藏

產前諸方

川芎散 三箇月後疑非胎即服

川芎壹兩生用

右爲細末空心濃煎艾湯調下貳錢腹內微動者當有子也

枳殼湯 五箇月後服滑胎易生

商州枳殼貳兩麩炒去穰石州甘草壹兩爍右爲細末每服貳錢百沸湯點空心食前一日三服或四服唐胡陽公主每産則經旬痛楚萬法不効服此藥遂驗自服藥後忌登高厠此方神妙滑胎易産他藥所不及但其胎緊小微帶黑色百日後肉色方漸變白唯産婦素虛怯者更宜斟酌緑枳殼性寒恐難多服也

蟹爪湯 姙娠僵仆失攄胎動轉上搶心甚者血從口出並不得息或注

下血胎不出則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母即得卧下血亦止其當產立生神効

蟹爪壹升約伍兩 阿膠貳兩剉碎勿炒

甘草炙剉 桂心不見火 各貳尺

右以東流水壹升煮取參分去滓內膠洋盡能一服佳不能一服者食頃再服若因急不能飲者灌之藥下子母俱活子死則母活若不經僵仆下血服此湯即止

又方 婦人胎孕偶有所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者可服

縮砂壹兩 和皮用淨熬斜於慢火上炒令熱透去皮只用仁

右爲細末每服貳錢熱酒調下覺動處熱即已安矣

又方 胎不穩坐卧不安可服

木賊草 去節 川芎 劉 各壹兩

右爲細末每服壹錢水壹大盞入金銀物同煎至陸分去滓空腹食前日三服

人參圓 婦人胎孕嘔吐不止名爲阻病或以尋常治嘔吐藥治之非也

宜服此藥

乾薑炮烈 半夏麴炒
人參去蘆切 各壹兩

右爲細末薄糊圓如雞頭大每服壹圓米飲下可加至叁圓此方出仲景金匱極妙

保生圓入月後服產前產後一切諸疾悉治

金鈆石舟壹分別杵

秦椒去目炒 官桂去皮不見火對

貝母去心劉　乾地黃洗劉焙乾

防風去蘆劉　糯米

甘草劉炒　大麻仁去殼

大豆卷黑豆芽是不乾脆之　黃芩劉　各貳分

石膏明淨硬者　麒麟竭

沒藥去石　龍腦各壹錢半

右件藥並須用州土上等好者擣爲細末以熟蜜陸兩入水壹分同煉令水盡和藥了却入臼內杵伍百下取

出平分柒拾貳圓每服壹圓產前產後血風頭旋身戰薄荷酒下月信不通當歸酒下赤白帶下温酒下臨產難產胎衣不下子死腹中橫產倒生死絶不語但看心頭熱氣在取壹圓京棗湯化開灌入喉中立甦產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐發熱增寒煩悶月候不調或多或少皮膚虛腫惡露不止虛勞中風口噤不語半身不遂

產前產後赤白痢大便祕澁血渴血暈狂語見鬼頭痛面色痿黃漸成勞瘦飲食無味並用溫酒研下催生當歸酒下產後中風血暈生地黃汁同煎十沸研藥灌口中禦風但五日壹服空心熱酒嚼下浴後溫酒嚼下中風不語身急如板用消梨穰薄荷同研藥灌口中候汗出了相次揭衣被當風坐卧立產其餘一切諸疾並用

當歸薄荷酒研下清酒亦得小兒天弔驚風用藥壹圓分作叁服薄荷酒下

五積散 臨產時服助氣催生

蒼朮貳拾兩 桔梗拾兩 去蘆

陳橘皮陸兩 去穰 白芷 去苗

甘草 炙 各叁兩 當歸貳兩 去蘆須洗切焙

芎壹兩半 洗剉 芍藥 白者剉

白茯苓 去皮剉 半夏 湯洗 各壹兩

麻黃 春夏貳兩秋冬叁兩 枳殼肆兩 麩炒去瓤別杵

肉桂去粗皮春夏叁兩秋冬肆兩別杵厚朴貳兩薑炙春夏壹兩半秋冬貳兩

右拾伍味爲麁末分作陸分大鍋內煖火炒令微赤香熟即止不可過焦取出以淨紙板藉上攤令冷入枳殼肉桂厚朴三物和之若產婦難產經三兩日不生胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁用藥末貳錢加順元散壹錢水柒分酒叁分煎至柒分相

繼兩服氣血內和即產胎死者不過
叁服當下其順元散亦須量產婦虛
實用之

又方

只用五積散貳錢入附子末壹錢水
壹盞同煎至柒分無順元散則用此

順元散

烏頭貳兩炮烈切片 附子炮去皮臍切片
天南星炮各壹兩 木香半兩槐乾劉

右爲末入前五積散同煎服

催生神効聖功散 此藥極滑胎易生其藥煎出婦人多可愛

一㕮切須令強服催生累得効

榆白皮 取深大根刮去赤皮取粉紅色者去心薄切焙乾秤

滑石各壹兩 沒藥半錢 研

當歸壹分 去蘆洗切 朱砂半錢 別研

右件爲細末次入朱砂再研和勻每服貳大錢水柒分盞煎叁兩沸及九箇月以來方可服如臨産覺陣痛亦

依前服自服此藥忌登高厠

催生安胎救命散

烏藥肆兩 別用醋炒黃色 前胡半兩 揀淨 去梗 蓬莪茂貳兩 炮乘熱鑱碎 菊花壹兩 去蓋須洗切焙 當歸半兩

右剉碎用好米醋炒乾爲度同爲末如死胎在腹用炒薑豆淋酒調藥叁錢連進叁服立下死血衝心炒薑豆淋酒下貳錢入童子小便半盞安胎

用熱酒下壹錢血山崩熱酒下壹錢
產後一切血疾皆可服尋常催生用
炒薑豆淋酒調參錢只壹兩服立生
藥須用新磁鑵收勿令失氣味

神効催生丹

臘月兎腦髓壹枚　麝壹錢別研
乳香末壹分須黃明者乳鉢內研細末外以冷水浸鉢輕研
丹丁香壹錢爲末須辛辣如荔支核大者佳不可用陳者

右一處研細用兎腦髓爲圓如○此

大慢火焙乾磁合收封糊合口不要出氣候產婦陣頻以溫丁香湯吞下壹圓產婦不痛其子順生男左女右手把藥出急洗藥焙令乾凡壹粒可用三次合時勿令鷄犬婦人孝子見服時婦人閉目取藥產婦閉目吞之神效

催生如聖圓

乳香好明淨者研如粉

右以生猪心血和圓如梧桐子大覺腹痛時濃煎茅香湯下叁拾圓嚼破服端午日合切忌婦人鷄犬見橫倒生只壹服此方絶妙

産後諸方

勝金湯 才産了便服去惡血止血暈

地黄汁貳分生 生薑汁壹分生

右用童子小便壹分同煎拾餘沸温服地黄生薑須是淨潔沙盆内研取

自然汁切不可犯生水

又方 治血暈至急

生地黃叁兩切碎 生薑叁兩切碎不去皮

右貳物相和同炒乾碾爲末每服貳錢研木香酒壹盞同煎三兩沸通口服壓下血立愈

又方 產後血暈欲死及餘血不盡被風吹即變成寒熱

生地黃肆兩 生薑肆兩

右並薄切新瓦乾之爲細末温酒調

下貳錢此二方俱妙

漬小便方（小便難喫用此法漬之）

烏梅伍箇（湯內洗淨）炙了甘草末貳錢炮了乾薑末壹錢

右叁味先於桃內用沸湯少許浸少時候烏梅軟即以熱小便壹盞許就桃內浸令產婦閉氣作壹服服之如欲再服即別用烏梅等一依前法重浸方可服不可更用浸了藥也若產

婦才分孩了即須以童子小便依尋常與之未可用此法第二次方可用此法

燒鹽法 初食鹽用此法燒之

好淨鹽不拘多少

右以葛葉裹作粽子樣於炭火內燒候鹽通紅如火即取出放淨地上一伏時候火氣盡研用

百草霜散 產後血暈可服

百草霜壹錢 秤即鍋底上黑煤也

生薑貳錢 秤去皮切炒乾 薑黃半錢

右爲末以生地黃煮濃汁調下貳錢

又方

劉寄奴壹握 剉 甘草半兩 炙剉

右以水壹椀半煎柒分去滓服才覺血暈熘壹服甚者再服無事覺腹痛即先煎下恐緩急煎不成也

黑散子 治療見產後諸證用藥門

琥珀 別研細　朱砂 別研

京墨 煅通赤放冷用　血苗灰 即鯉魚鱗灰也

新羅白附子 炮烈　百草霜 乃鍋底上黑煤也

黑衣 即竈額上煤也倒掛者亦得又謂之烏龍尾亦黃灰得　各半兩

麝 別研極細　白殭蠶 剉炒去絲嘴

川當歸 洗去蘆須切焙　各壹分

右為末每服貳錢炒薑溫酒調下

烏金散 產後血暈或惡露不盡死胎不下並可服

大豆　生薑各肆兩

蓬莪茂劉 當歸去蘆須洗切焙

黃連去須各壹兩 椒皮貳兩

右先下生薑大豆炒候薑乾即下當歸茂黃連炒看豆紫色透心即以椒皮點火入藥銚中椒皮盡成黑灰即傾地上以紙襯出火毒爲末每服貳錢童子小便調下產後雖無事服之亦佳

金黃散產後惡血攻心發燥呵服

蒲黃半兩隔紙炒 延胡索壹兩劉

桂心壹分不見火

右爲細末每服壹錢用烏梅湯放冷調下

麒麟竭散產後惡血攻心漸次暈悶可速服

麒麟竭壹兩爲末 生薑半兩切碎

右用酒壹盞同煎至捌分去滓帶熱通口分兩服立驗

千金散產後惡物不下或不盡腹痛可服

桂心去皮不見火剉 葳靈仙鐵脚者去根剉

白芷去蘆劉　當歸去蘆須洗切焙
牡丹皮劉　各壹兩
右同杵爲細末每服貳錢煎神麴湯調下

地黃散產後惡物不盡腹痛可服
熟乾地黃壹兩略炒
生薑肆兩細切如蠅頭大於銀器或銅器或新瓦上炒令黑焦煙起爲度半兩　當歸壹兩洗去蘆須切焙
右同杵爲細末每服壹大錢用生薑

炒憂小便調下

牡礪散 產後惡露不絕可服

牡礪半兩 燒 龜甲半兩 用好醋炙黃

右爲細末每服温酒調下貳錢食遠

桃仁散 產後心腹痛可服

桃仁貳錢 去皮尖并雙人炒黃秤

蓬莪茂壹錢半 秤用慢火炮取出乘熱鑱碎

桂心貳錢 不見火對 當歸肆錢 去蘆須對焙秤用

右爲細末熱酒調下壹錢如不喫酒

只用水壹中盞藥末貳錢煎柒分帶熱服

川芎散 產後心腹痛可服

川芎 洗剉　桂心 不見火剉
木香 剉懷乾　當歸 去蘆須洗剉焙
桃仁 去皮尖并雙仁炒黃 各壹兩

右爲細末每服壹錢熱酒調下如不欲飲酒即用水壹盞藥末貳錢煎至柒分帶熱服不拘時候

金花散

產後血暈一切腹脇疼痛不以虛實可服

薑黃 片子者劉
肉桂 去麤皮不見火
劉寄奴 劉
芎藭 洗劉
蒲黃 隔紙炒
熟乾地黃 焙各貳兩
牛膝 去根酒浸一宿劉碎焙乾用
虎杖 洗劉
赤芍藥 劉碎
乾葛 勿用色黑者各壹兩

右爲細末每服貳錢如疾勢輕者即以水或酒用壹盞煎至柒分和滓溫服重急者以豆淋酒同煎服

當歸散 產後痢可服

官桂半兩 去皮秤用生薑貳兩取自然汁塗炙令薑汁盡爲度

當歸壹分 去蘆須洗切焙

右爲細末每服貳錢米飲調下未止再服

人參散 產後虛汗發熱可服

人參 切去蘆作片子焙 當歸 淨洗去蘆切焙 各半兩

右分作兩服每用猪石子壹隻切作捌片以灰去血水用水貳盞葱貳莖

粳米壹合生薑參片煎壹盞去石子
等温服早晚各壹服

四神散 產後血氣心腹痛可服
當歸 去蘆須剉洗焙乾用 芍藥 白者剉
川芎 剉 各壹兩 乾薑半兩 炮烈剉

右爲細末每服貳錢熱酒調下

香桂散 產後臍下疼痛不止可服
當歸 去蘆須洗焙 川芎 剉 各壹分
官桂半兩 去皮不見火剉

右爲末分作叁服每服酒壹盞煎叁
五沸更入小便少許同煎至柒分温
服甚者再服必效如不欲入酒即以
水代之

當歸散

婦人產後血氣血刺血暈血崩惡露不止或虛或腫或見神鬼或如中風或瀉或痢或如瘧疾者其功效如神兼治產後一十八病唯瀉或喘本方不治

肉桂 去麤皮不見火
芍藥 白者劉
當歸 去蘆須酒洗焙
乾薑 炮烈劉
乾地黃 湯洗劉焙乾
蒲黃 隔紙上炒

甘草炙劉各壹兩　黑豆貳兩炒熟去皮

右爲細末温酒調下貳錢日進叁服不拘時候甚者叁服愈常服日兩服或壹服

柿湯　產後嘔噦氣亂心煩可服

乾柿壹箇切碎水壹大盞煮熟熱呷甚妙温即再煖令熱呷喫

荆芥散　治產後一切難治之疾

荆芥不以多少

右爲細末每服壹錢或貳錢温酒調下立効有急疾及風候宜速爲之此方絶妙家中常用之産婦雖無病每日進壹服只用童子小便調下有急疾用小便酒各半調之尤佳

陳梅散 産後痢可服

多年白梅不以多少

右燒成灰存性研爲細末陳米飲調下壹大錢甚妙

治產難諸方

產難子死腹中又姙兩兒壹生腹中壹死腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪壹升約伍兩

甘草肆兩炙 阿膠叁兩用蛤粉炒 劉

右以東流水壹斗先煮貳味至叁升即內膠膠洋頓服之不能一頓服者食頃再服若至困灌之即活作東向

竈葦薪煑之此方與前蟹爪湯相犯唯不用桂心

治難產

榆白皮壹升切　瞿麥揀淨

木通剉　各叁分　牛膝去苗根酒浸壹宿剉焙乾用

大麻仁去殼　各壹兩

右爲麄散每服肆錢水壹中盞煎至

陸分去滓溫服頻服佳

又方

當歸貳兩去蘆須洗切焙　芎壹兩剉

右爲㕮散每服肆錢水酒各半中盞煎至陸分去滓温服頻服佳若慮胎在腹已死者服此藥胎死即下胎活即安神効

又方

赤小豆壹合略炒　黄明膠壹兩剉

右以水壹盞煮豆令熟去滓内膠令消温温頓服

又方

取馬嚼壹枚覺痛即令產婦左手把之甚効

又方

取東引槐枝手執之

又方

取桃仁分破書壹片作可字壹片作出字依前還合令母吞之即產此天真法也神効

又方

子母早生

右收五方氣飲氣書二道用茅香湯吞之

子母早晚

又方

取苴麻子肆粒去殼水研取汁少許塗產婦脚心中寸產便洗却并貼臍中亦良

又方

取皂角末少許吹母鼻中令嚏其

子便下

又方

取大豆一顆擘破書其夫姓名於上以酒吞之

又方

雄虵蛻一條大者以頭按產婦臍中自腰後左繞轉却以尾按臍中寸亟便下此法極驗虵蛻在高處者爲雄在地者爲雌須頭尾全者

逆產諸方

治逆產

半夏（湯泡七遍去滑焙乾）白歛各壹兩

右爲細末每服貳錢生薑酒調下難產壹服橫產貳服倒產叁服兒死肆服若胎衣不下母氣欲絕亦宜服之每壹服如人行壹里再進如鼈麥貳兩尤妙小產只壹服愈

又方

急以鹽和輕粉塗子脚底又急以小針刺子脚底即轉巽痛驚製入即順出

又方

以鹽摩母腹即順出

又方

當歸不以多少微炒去蘆鬚洗剉焙右爲細末温酒調下貳錢

又方

艾葉壹兩炒

右以酒壹大盞煎至陸分去滓分作兩次温服立効水煮亦得

又方

車前子不以多少

右爲細末温酒調下貳錢

又方

兎絲子不以多少

右爲細末温酒調下壹錢

又方

以手中指取釜下墨交畫子足即順生

橫產諸方

葵子貳合　黃明膠 剉

滑石末各壹兩

右爲細末以水壹大盞半煎至壹盞去滓分作叁服溫服

又方 逆產橫產難產胎瘦姙娠產前後虛損月候不調崩中皆可服

百草霜　香白芷各壹兩

右件爲細末每服貳錢童子小便壹茶脚許調勻以沸湯肆伍分化開服止壹服甚者再服愈

又方　橫產逆產胎死腹中及胎衣不出母欲絶皆可服

半夏　熱湯浸洗七遍去滑焙乾

白斂　劉砕　瞿麥頭子各半兩

右爲細末每服貳錢炒生薑酒調下

又方

雚麥壹兩

右以水壹大盞煎至陸分去滓分作兩服温服

又方

牛尿不以多少

右塗毋腹上即順出

又方

蛇脫皮不以多少

右用炭火燒作灰研令極細温酒下

貳錢若子死腹中服之立下

胎衣不下諸方

產婦臨產先脫常着衣裳一件覆竈頭即無胎衣不下之厄此法極驗不可不信也

治胎衣不下

大牛膝壹兩去苗葵子壹合

右搗碎以水壹大盞煎至半盞去滓兩服温服

又方

繫臂帛燒灰酒半升調下

又方

飲洗兒水壹口立下

又方

蕘麻子叁粒　鼠粘子壹分即牛蒡子

右爲細末若子死腹中無藥可下即以醋糊調藥塗在口上以紙貼之立下

又方

當歸壹兩洗去蘆須切焙乾

瞿麥揀淨　芎藭洗剉各叁分

右爲麄散以水及米醋各壹中盞煎至壹盞分作叁服温服

又方

當歸洗去蘆須切焙乾　鱉甲酥塗炙令黄各叁分

右爲細末先取産多婦人髮半兩燒爲灰細研入當歸末以水壹大盞半煎取捌分然後下盡鱉甲末煎伍柒

沸分爲叁服若數日不產子死腹中者皆可服服後如人行四五里再服

又方

水銀壹彈子大

右斡開產婦口灌之扶起令坐不食頃扶起令倚立其子即下雖臨產面青舌赤沫出欲死子猶不出并產婦已死而欲令子出者可服

治產前產後痢疾

癩虼蚾端午日收窨乾

右產前痢用前兩脚產後痢用後兩脚燒灰存性爲末米飲調下食前服此藥家中累曾經驗神効

許學士產科方　名叔微字知可

滑胎枳殼散

商州枳殼貳兩去穰剉作小塊麩炒　甘草壹兩炙剉

右爲末每服貳錢百沸湯點服空心食前日叁服凡懷孕六七月以上即

服令兒易生初生胎小微黑百日以後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣爲衆方之冠

內補圓治姙娠衝任脉虛補血安胎

熟乾地黃貳兩剉焙 當歸壹兩去蘆須洗焙乾

右細末煉蜜和圓如桐子大每服叁肆拾圓温酒下無時

上三方諸集皆載之在人用之如何爾

大率婦人姙娠唯在抑陽助陰素問云

陰搏陽別爲之有子蓋關前爲陽關後爲陰尺中之脉按之搏手而不絶者娠子也婦人平居陽氣微盛無害及其娠子則方閉經隧以養胎若陽盛搏之則經脉妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交雜別生它病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾枳殼散差寒若單服之恐有胎

寒腹痛之疾以內補圓佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及也

木香圓治婦人有孕傷食

木香貳錢劉　京三稜慢火煨乘熱劉作片子　人參去蘆切片焙　白茯苓各叁錢

右細末麵糊圓菉豆大每服叁拾圓熟水下

白朮散治妊娠氣不和調飲食

白朮 切作片子焙乾　乾紫蘇各壹兩
白芷 微炒　人參 去蘆　各叁分
川芎 洗剉　訶子皮
青皮 去白　各半兩
甘草壹分 炙剉

右細末每服貳錢水壹盞薑叁片煎柒分不拘時温服之

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若任

子飲食不節生冷毒物恣性食啖致脾胃之疾故妊娠傷食難得藥唯此二方最穩

紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇莖葉壹兩　大腹皮剪碎　人參去蘆切片　川芎劉開　陳橘皮去白

白芍藥各半兩

當歸叁分（去蘆須切） 甘草壹分（炙）

右細剉分作叁服每服用水壹盞半生薑肆片葱白柒寸煎至柒分去滓空心服之

曾有婦人累日產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草太早心懷下一懼氣結而然非順不順也素問云恐則氣下盖恐則精却却則上焦閉閉則氣還還

則下焦脹氣乃不行矣得此藥壹服
產及婦人六七月子懸者亦用此數數
有驗不拾服胎便近下也

下死胎方

桂末貳錢麝香當門子壹箇同研
煖酒服須臾如手推下比之用水
銀等此藥不損血氣

琥珀散治婦人月經壅滯每發心腹
臍疼痛不可忍及治產後惡露不快血

上愴心迷悶不省氣絶欲死

荆三稜　蓬莪蒁

赤芍藥　劉寄奴

牡丹皮　官桂削去皮不見火令碾爲末後入

熟乾地黄劉焙　菊花揀去枝梗

真蒲黄　當歸去蘆頭焙乾秤各壹兩

右前伍味用烏豆壹升生薑半斤切片米醋肆升同煮豆爛爲度焙乾入後伍味同爲末每服貳錢温酒調下空

心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只壹服產後血衝心貳服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥易合宜多合以救人

佛手散治婦人妊孕五七月因事築磕著胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絶用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下此藥催生

神妙

當歸陸兩洗去蘆切片炒 川芎肆兩剉炒

右麄末每服叁錢水壹小盞煎候相次欲乾投酒壹大盞止壹沸去滓温服口噤灌之如人行五七里再進不過叁兩服便生有一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔齒去血多昏運欲倒者去水煎服愈風散治產後中風口噤牙關緊急手

足痺瘓

荆芥穗輕焙過壹兩

右爲細末每服貳錢温酒調下

經驗産寶皆有之陳選方中用舉卿古拜貳味蓋切脚隱語以秘之也此藥委有奇効神聖之功大抵産室但無風爲佳不可衣被帳褥太暖太暖即汗出汗出則腠理開易於中風便昏冒記有一婦人産後遞護太密閤内更生火睡久

及醒則昏昏如醉不省人事其家驚惶
醫用此藥佗以交加散祝云服之必睡
睡中必以左手搔頭覺必惺果如其言
交加散治婦人榮衛不通經脉不調腹
中撮痛氣多血少結聚爲瘕產後中風

生地黃伍兩研取汁　生薑伍兩研取汁

右交互用汁浸漬晝夕各炒黃漬汁
盡爲度末之尋常腹痛酒調下叁錢
產後尤不可關

蒲黃散治產後出血太多虛煩發渴

真蒲黃末每用貳錢以米調飲下

渴躁甚者新汲水調下

護胎方治妊娠時氣身大熱令子不落

伏龍肝爲末水調塗臍下貳寸乾

則易瘥即止又取井中泥塗心下

乾則易

又方

浮萍 乾者 川朴消

蛤粉　大黃劉碎微炒

藍根各壹兩劉碎

右爲末水調封臍上安胎解煩熱

麻仁蘇子粥治婦人產後有三證疾鬱冒則多汗汗則大便秘故難於用藥唯此粥最佳且穩

鹿屑湯治娠孕熱病胎死腹中

鹿角屑壹兩水壹椀葱白五莖豆豉半合同煎至六分去滓溫分貳

服極妙

治婦人生產數日而下及胞衣死胎不下者方

用萆麻柒粒去殼研如泥塗足心纔下便急洗去此崔元亮海上方人但未知爾政和中壹鄉人內子產二日不下予令謾試之一塗俄頃便下自後常用極驗

衛生家寶産科備要卷第六