四明宋氏女科秘書序

余先世居郢州之湘。郎今商邱邑也。唐開元時。始祖廣平公璟。精於醫門。更有疾。見之堂下。察色而知之。審治之。若中鵠也。世莫不稱神焉。夫人余氏。竊其術以行於世。雖閭閻小民之婦。靡不被其澤。而其傳尚於婦女一科。宋建炎初。有祖諱欽者。由進士。任七子城。使扈駕南遷。卜居四明。嗣後有以科名並於朝者。有以醫術鳴於時者。醫與政。若院使。世世相承。代不乏人。至於菲才。碌碌小業。舉子弗售。蓋欲以覓蠅頭之利于世者。殆四十餘載矣。雖不敢自謂能發前之所未發。然舉其耳目之所睹。而生平之所經驗者。筆之於書。其有詞句。豈曰小補云乎哉。歲月蹉跎。有志未遂。茲應郃郡樂清邑承君之請。遂不自揣。乃摘其大旨。書爲一帙。名曰女科秘書。蓋加其志。錄其所藏。以廣其傳也。若婦人雜症。

與男子治法不同。有志者。於全書加之意焉可也。若曰茲錄也。不過採集羣書之英粹者耳。非家秘譜也。噫。但車同軌。書同文。索隱行怪。非吾之所敢知也。試與諸書而並觀辟之。烏鷺同棲。皂白攸分。涇渭同流。清濁自別。余不贅爲序。

萬歷壬子五月朔。宋廣平公二十七代孫。六十老翁。林皐謹撰。

附詩一首。衛通敷代溯流遠。唐宋元明世濟深。勘破玄機如中鵠。勿勞歧路問亡羊。一丸娛老心存濟。半隱延年生計長。杏林橘井皆陳迹。尚賴餘芳種德新。

宋林皐養吾生題。

四明宋氏女科秘書凡例

一女科之書。自產寶全書而後。間有發明。亦多掛漏。是編務去陳言。獨存精義。意簡詞賅。使學者一覽無餘。更不必他求矣。

一病機論賦。璟公集羣經。創論於前。林公採名論。補遺於後。參以己見。更加圈點。其眼者。自能鑒也。

一醫方古人有險僻相類者。均爲刪去。茲特撮其靈驗切要者。二百二十六道。載在各症條下。任其選用。並按加減禁忌。以戒妄投。

一藥性泡製。分兩輕重。皆斟酌盡善。一無遺憾。其中偶有未諳泡製。未計分量者。此在臨症時。貴乎權變得法。以備妙用。

一字句用夾圈者。是大主腦。用緊圈者。是認法。用單圈鉤點者。是要訣。使閱者

醒心快目。語語分明。庶免迷津之失矣。

一症下無湯散名。只有藥味者。俱環林二公生平自創。歷驗始載。一切奇異之方。概置不錄。

一是編原爲婦人而設。雖言語反覆。不厭煩絮。以期於暢。然亦恪遵古訓。非創爲異說也。

翼山後學王署香僭註拜讀

四明宋氏女科秘書目錄

病機賦……一
精血篇……五
婦人月經何名天癸先期後期變生諸病論……六
論形質變胎之始……八
經候不調門　內附方二十六道……一一
經閉不行門　內附方一十一道……一七
經漏血崩門　內附方一十三道……三四
赤白帶門　內附方八道……四〇
虛勞門　內附方一十一道……四三

求嗣門 內附方九道……四八
姙娠門 內附方五十三道逐月調理在內……五四
小產門 內附方二道……七四
產育門 內附方十三道……七六
產後門 內附方六十四道……八三
乳病門 內附方七道……一〇五
乳岩門 內附方一道……一〇八
婦人諸病門 內附方八道……一〇九

以上總計論賦四篇。症候一十三門。醫方二百二十六道。

四明宋氏女科秘書

宋林皐述

病機賦

竊聞醫雖小道。實寄死生。最當通變。不宜固執。欲明藥石治病之理。必悉望聞問切之情。藥推寒熱溫凉厚薄之氣。辛甘淡苦酸鹹之味。升降浮沉之性。宣通補瀉之能。脉究浮沉遲數滑濇之形。表裏寒熱虛實之應。呵緩嫩柳之和。弦鈎毛石之順。藥用君臣佐使。脉分老幼瘦肥。藥乃天地之精。藥宜切病。脉爲血氣之表。脉貴有神。」病有外感內傷。風寒暑冷燥火之機。治宜宣通補瀉。滑濇燥濕重輕之劑。外感係乎內傷。風寒不同溫熱。外感宜瀉。而內傷宜補。寒症可溫。而熱症可清。補瀉得宜。須臾卽愈。溫清失度。頃刻人亡。」外感風寒。必分經而解散。內傷飲食。可調胃以消鎔。肺陽主氣。司納受陽。常有餘。脾陰主血。司運化。

陰。常。不。足。胃乃六腑之本。脾爲五臟之原。胃氣弱。則痰生。脾陰足。則邪息。調。理。脾。胃。爲醫。中之。王。道。節戒。飲。食。乃却。病之良。方。一病多寒冷鬱氣。鬱發熱。或出七情動火。火動生痰。有因行藏動靜。以傷暑邪。或是出入雨水而中濕氣。或有飲食失節而生濕熱。倘或房勞過度以動相火。制伏相火。要滋養其眞陰。祛除濕熱。須燥補其脾胃。外濕須表散。內濕須淡滲。陽暑可清熱。陰暑可散寒。尋火尋痰。分多分少而治。究表究裏。或汗或下而施。痰因火動。治火爲先。火因氣生。理氣爲本。治火輕者可阿。重者從其性而升。消痰理氣。微則宜調。甚則究原而發散。實火可瀉。或瀉表而或瀉裏。虛火宜補。或補陽而或補陰。暴病之爲火。怪病之爲痰。寒熱溫濕之爲風。去痰有異。濕清燥潤。散爲治不同。有因火而生痰。有因痰而生火。或鬱久而生病。或病久而生鬱。金木水火土五鬱。當分洩折達發奪五治。宜審。鬱則生火生痰而生病。病則耗氣耗血而致虛。病有微甚。治

有逆從。微則逆治。甚則從攻。病有標本。治有緩急。急則治其表。緩則治其本。法分攻補。虛則補。實則攻。少壯新邪。專攻爲要。老弱病久。兼補爲規。久病兼補虛而解鬱。陳癥或蕩滌而消鎔。積於腸胃。可下而愈。塊在經絡。宜消而痊。女人氣滯於血。宜開血而行氣。男子陽多乎陰。可補陰以配陽。薤蓉山藥。男子之佳珍。香附殼砂。女人之至寶。氣病血病二症宜分。陽虛陰實兩般弗紊。陽虛氣病。晝重而夜輕。陰虛血病。晝輕而夜重。陽虛生寒。寒生濕。濕生熱。陰虛生火。火生燥。燥生風。陽盛陰虛亦生火。火逼血而錯經妄行。陰盛陽虛亦生寒。寒滯血氣。而週身浮腫。陽虛畏外寒。陰虛生內熱。補陽補氣。用辛温之品。滋陰滋血。以苦寒之流。調氣貴乎清凉。和血必須辛熱。陽氣爲陰血之引導。陰血爲陽氣之依歸。陽虛補陽而陰虛滋陰。氣病調氣而血病和血。陰陽兩虛。惟補其陽。陽生而陰長。氣血俱病。先調其氣。氣行而血隨。藏水發水。以節陽氣之燔。滋水養水。以制

心火之原。火降水升。斯人無病。陰平陽秘。我體常春。小兒純陽而無陰。老者多死而少血。肥人氣虛而有痰。宜豁痰以補氣。瘦者氣虛而有火。可瀉火以滋陰。膏粱無厭發癰疽。熱燥所使。淡薄不堪生腫脹。寒溫而然。北地高聳。宜清熱而潤燥。南方洿下。可散濕以溫寒。病機既明。用藥勿忒。以方加減存乎人。務審而合宜。用藥補瀉在乎味。隨時而須換。氣奇偶復。七方須知。初中末三次要察。初則宜攻。中則調和。末則收補。寒因熱用。熱因寒用。高者抑之。下者舉之。外者發之。內者奪之。寒則堅凝。熱則行開。風能勝濕。濕能潤燥。辛能散結。甘能緩中。淡能利竅。苦能泄逆。酸以收耗。鹹以軟堅。升降浮沉則順之。寒熱溫涼則逆之也。病有淺深。治有難易。初感風寒。乍傷飲食。一藥可愈。舊存痰癖。久患虛勞。百方難療。履霜之病亟療。旡妄之藥勿試。病苦挾虛。宜半攻而半補。醫稱多術。或用灸而用針。針有却病之功。灸有回生之力。針能去氣病而作痛。灸則消血癥而

成形。臟寒虛脫者。治以灸痼。脉病攣痹者。療以針刺。血實蓄結腫熱者。宜從破攻。氣壅痿厥寒熱者。當仿引導。經絡不通。病生於不仁者。須覓膠醴。氣血凝注。病生於筋脉者。可行熨藥。病慓悍者。按而收之。乾霍亂者。刮而行之。醫有十三科。宜精一派。病有千萬般。仔細推詳。姑撮要言。聊陳管見。後之學者。庶達迷津。

精血篇

夫精血以分男女之本原者。何也。男子以精爲本。女人以血爲原。男子爲陽。陽中必陰。陰中之數八。故一八而陽精降。二八而陽精溢。女子爲陰。陰中必陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而精血溢。陽精陰血。皆飲食五味之實秀。爲男女之本源也。是以精未通。而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之病。陰已痿而思色以降其精。則精不出而肉敗。小道澁而爲淋。精已耗而復竭之。則大小便牽痛。愈便則愈痛。愈痛則愈便。女子天癸已至。踰十年無男

子合則不調。未踰十年。思男子合不得。亦不調。不調。則舊血不出。新血悞行。或陵而入骨。或變而爲腫。或雖合而難子。合男子多。則瀝枯虛人。產乳衆。則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。

■婦人月經何名天癸先期後期變生諸病論

夫女子十四而天癸至。任脉通。太衝脉盛。故月候以時下。所謂天癸者。月水也。天者。謂天眞之氣。癸者。北方陰水也。其候常以三旬一見。則无病矣。一或氣血不調。陰陽愆伏。過於陽。則經脉先期而來。過於陰。則經脉後期而至。蓋血性得熱。則宣流。寒則凝澁。陰氣乘陽內。寒血凝。故其來常少。陽氣乘陰。血熱流散。故其來常多。其或經水不調。或紫或黑。丹溪云。經水者。陰血也。陰必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣之配。因氣而行。成塊者。血之凝也。將行而痛者。血之滯也。來後而痛者。氣血皆虛也。色淡者。亦虛也。而有水混之也。錯經妄行者。氣之亂。

也紫者氣之熱也黑者氣之甚也今人但見黑者紫者成塊者作痛者皆指風冷乘之而行温熱之劑爲禍不輕矣不特此也二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息奔者死不治夫經者血脉津液之所化也津液既竭爲熱所燥肌肉消瘦時見燥渴血海枯竭病名血枯大抵陰爲陽所搏温劑不可太過過則無益而反害治法經絶宜瀉胃之燥熱補益氣血一以涼血和血爲主其血自行矣經云陰虚陽搏爲之崩此由脾胃有虧下陷于腎與相火相合温熱下迫經漏不止其色紫黑腰臍下痛寒熱往來兩脇急縮或四肢困熱心煩不得眠臥暴然而下也治法宜大補脾胃升舉氣血其病自愈矣而猶未也所謂帶下者任脉之病也任脉自胞上過帶脉貫臍而上然其病所發正在過帶脉之分而淋瀝以下故曰帶下也內經云小腹窘熱洩出白液謂寒熱屈帶而不散遺客於帶脉之間血物滿溢遂洩而下綿綿不絶多不痛也其爲

症也。頭痛昏眩。口苦舌乾。咽嗌不利。小便赤濇。大便秘滯。脉實而數者。皆熱症也。俗醫不知。而誤用辛熱之藥。病之微者。偶中有之。蓋辛熱之性。暫能開通鬱結。散氣流濕而致效也。或病之甚者。鬱結不能開通。舊病轉加。熱病新起。以致於死者多矣。大抵以辛劑佐以苦寒治之。開鬱除濕。去熱散氣。無不中其病而免於害矣。至於血虛潮熱。盜汗筋攣。則爲虛勞。血少水涸。燥氣乘肺。則爲乾咳。宿寒留滯。血爲氣搏。則爲腹痛。敗血結塊。時發寒熱。則爲癥瘕。或風寒滯經。血化水。流溢四肢。爲之血分。或脾不制水。與血水併浮脹肌肉。謂之虛腫。此諸病所自生。而孰非經水不調以致之哉。治法猶當隨症轉移之妙。存乎人之一心。

■論形質變胎之始

原夫天垂六氣。地布五行。五六相參。造化萬一。天地之道。於乎立矣。人生兩間。稟天之陽以爲氣。稟地之陰以爲血。則人生一小天地。耳彼其五臟之相生也。

果孰爲之始而孰爲之終乎非形之初命門先具天一生水壬爲陽水合丁之陰火而生丙命門有然後生心心主血脉丙爲陽火合辛之陰金而生庚有心然後有肺肺主皮毛庚爲陽金合乙之陰木而生甲有肺然後生肝肝主筋爪甲爲陽木合己之陰土而生戊有肝然後生脾脾主肌肉戊爲陽土合癸之陰水而生壬有脾然後生腎腎主骨髓（心肺肝脾腎丙庚甲戊壬）夫胚胎之始兆也受水精而生血脉受火精而成氣受金精而成筋受木精而成骨受土精而成膚革皮毛五形具而百骸皆備此所以集萬物之靈也豈惟是哉娠之在母腹也食氣於母所以養其形食味於母所以養其精此皆有經之可証者也聖濟經云原四時所化始於木也究十二支所養始於肝也故一月血凝足厥陰肝經養之胆乃肝之腑二月胚兆足少陽胆經養之三月陽神爲魂手厥陰胞絡經養之四月陰靈爲魄手少陽三焦經養之五月五形分五臟足太

陰脾經養之。六月、六律定六腑。足陽明胃經養之。七月、七情開七竅。通光明也。手太陰肺經養之。八月、八景神具。濟眞靈也。手陽明大腸經養之。九月、宮室羅布。已定精也。十月氣足。萬象成也。足太陽膀胱經養之。（一肝二胆三胞絡四三焦五脾六胃七肺八腸九十膀胱不養之經心小腸切記）自肝爲始。藏腑相資。各養三十日。此食味於母以養其精也。然手太陽小腸經。手少陰心經。此二經獨不在養精之數者何哉。平居之時。在下爲月水。有孕之時。在上爲乳汁。此所以不養胎也。雖然。斯特孕育之已成者而言也。昔人有妻妾多而無子。擇良家未笄之女相配。亦無子。曰求男有道乎。褚澄曰。合男女必當其年。必二十而嫁。此皆陰陽之氣完實。然後交合。則交而孕。孕而育。育而子。堅壯强壽。今未笄之女。天癸始至。已近男色。陰氣早泄。未完而傷。未實而動。是以交而不孕。孕而不育。育而子胞不壽。此配合太早。有傷陰陽以無子也。然有婦人所產女者

何多慾之故也。所產皆男者何。皆男子節慾。惜精。以婦人月經行後。一日三日五日夜半生氣時。瀉精者。受妊必男。經行後二日四日六日瀉精者。受妊必女也。過此雖交不妊矣。噫。術豈多乎哉。其要節慾以全其眞。然後配合得子而壽。素問云。陰陽所奉。其人壽也。謹論。

■經候不調門 附方二十六道

經曰。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。而經脉於是乎通矣。夫心主血。脾統之。而胃爲任之元也。養其心則血生。實其脾則血足。氣盛則血行矣。古方耗其氣以調其經。則正氣愈耗。血無所施。非調經之要也。經行之際。與產後一般。將理失宜。爲病不淺。當戒暴怒。莫損于衝任。遠色慾。莫傷於血海。一有鬱抑。宿血必停矣。走於腰脇。注於腿膝。遇新血搏擊。則疼痛不已。散於四肢。則脈木不仁。入於血室。則寒熱不

止。或怔忡而煩悶。或入室而狂言。或湧上出。或歸大腸。皆七情六淫之所致也。治法例后。

分心氣飲。婦人屬陰。性多執滯。有事不發。只內鬱而已。所以十病之生。九因煩惱而來。血凝氣滯。諸病成矣。治法依本方。

桔梗　枳殼　木香　檳榔　烏藥　香附　木通　肉桂　芎藥　茯苓　大腹皮　桑皮　青皮　陳皮　眞紫蘇　羌活　甘草

右剉二劑。姜三片。棗二枚。燈心三十條。水二鍾。煎八分。空心溫服。渣更煎服。

調經湯。加減例後。

白當歸酒洗　淮生地酒蒸姜汁炒　川芎酒洗　白芍藥酒炒　廣陳皮　香附酒炒　白朮麩炒　丹皮　砂仁　炙甘草

先期者。血熱也。加黃芩酒炒　黃連姜汁炒七分

後期者。血虛也。加黃芪蜜炙　倍加當歸　川芎

腹痛有塊者。加玄胡索炒　丹皮　川斷

有熱者。加　地骨皮　軟柴胡

有赤白帶者。加　升麻酒炒　柴胡酒炒　半夏姜汁炒　黃柏酒炒

茯苓去皮　蒼朮泔水浸　知母酒炒　干姜泡　升。陽。除。濕。也。

若肥盛者。痰脂滿子宮。加　半夏　南星　陳皮

茯苓去皮　蒼朮生茅山者爲佳

若瘦怯者。血少不攝精。倍加　當歸　川芎

經血過多者。加　炒干姜五分　炒荆芥八分

經血不通者。加　桃仁　紅花　蘇木

氣盛善惱者。加　烏藥　陳皮　香附　柴胡

延胡索湯。治婦人室女。七情所致。血與氣並心腹疼痛。或連腰脇。甚作搐搦。一切氣血經候不調。並宜服之。臨經時感寒觸怒。多有此症。服之一劑而痊。

玄胡索　蒲黃　赤芍　姜黃　乳香去油一錢

當歸酒洗各一錢五分　木香不見火　沒藥各一錢　甘草炙八分　以上作一服。姜三片。空心服。

桃仁散。治婦人月水不調。或淋漓不斷。斷後復來。來如瀉水。四肢虛倦。不能飲食。腹堅痛。不能行動。月水或前或後。或經月不來。多思酸食。治以

桃仁　半夏　當歸　牛膝　桂心

人參　蒲黃　丹皮　川芎　澤蘭各一錢

赤芍藥　生地各二錢　甘草五分

右作一服。姜三片。食前服。

經水先期而來者。血虛有熱也。治當補血清熱。

當歸　艾葉三分　川芎　白芍

黃連姜汁炒八分　阿膠炒　條芩　黃柏

香附　甘草　空心溫服

經水過期不來作痛者。血虛有寒也。治當溫經養血。

當歸　川芎　白芍　熟地　生地

紅花　香附　肉桂　蓬朮　知母　桃仁甘个去皮尖

木通　甘草　空心溫服　蘇木

經水將來作痛者。血瘀氣滯也。腹中陣陣作痛者。乍作乍止。氣血俱實。治當以行經順氣。

當歸　川芎　白芍　生地　黃連
桃仁　香附　紅花　玄胡索　丹皮
莪朮

右剉一劑。空心溫服。如發熱。加　柴胡　黃芩

經行着心氣腹腰脇疼痛者。乃瘀血也。治當順氣消瘀。

當歸　川芎　白芍　生地　紅花
桃仁去皮尖　玄胡索　莪朮　青皮　香附

右藥空心服

經行過期而來。紫黑成塊者。氣鬱血滯也。治以調經順氣。

當歸　川芎　白芍　生地　紅花
桃仁去皮尖　牡丹皮　青皮　香附　玄胡索

甘草　空心服

經水過期而來。色淡者。痰多也。治當以活血化痰。

當歸　川芎　白芍藥　生地黃　陳皮
白茯苓　半夏　甘草　右藥加生姜三片。食後服。

經水過期而來作痛者。血虛有熱也。治當生血清熱。

當歸　川芎　白芍　生地　丹皮
桃仁去皮尖　紅花　香附　木香　玄胡索
甘草

經水過多。久而不止者。或血崩也。治當以涼血補血。

當歸　川芎　白芍　生地　白朮
條芩　阿膠炒　山梔　地榆炒　荆芥炒

香附炒　甘草　白茯苓

右藥空心服。久不止者。搗茅根汁。磨京墨同服。

經水行後作痛者。氣血虛也。治當調養氣血。

當歸　川芎　白芍酒炒　熟地　人參

白茯苓　焦白朮　甘草　干姜　右藥加姜三片。棗二枚。空心服。

經水去多。久而不至。發腫滿者。是脾經血虛也。治當以補血健脾利水。

當歸　川芎　白芍　熟地　白朮

白茯苓　砂仁　木香　陳皮　厚朴

蘇子　大腹皮　玄胡索　猪苓　木通

香附　甘草　牛膝

經水月久不行。發腫者。是瘀血滲入脾經也。治宜活血健脾行氣。

當歸　川芎　白芍　紅花　丹皮
桃仁　干姜　肉桂　厚朴　枳壳
木香　牛膝　香附　玄胡索

經水月久不行。腹脇有塊作疼者。是血結癥瘕也。治當調經止痛。

當歸　川芎　砂仁　木香　小茴香
厚朴（姜汁炒）　乳香（去油）　枳實（麩炒）　桃仁　紅花
丹皮　香附　牛膝　玄胡索　肉桂

錯經妄行於口鼻者。是火載血上。氣之亂也。治當滋陰降火。順氣調經。久而不治。乃成虛怯。

當歸　川芎　白芍　生地　黃芩

山梔炒黑　白茯苓　犀角　阿膠　陳皮
麥冬去心

經行身體痲痹。寒熱頭痛者。乃觸經感冒也。加味五積散。治婦人遇經行時。沿身疼痛。手足痲痹。或生寒熱。頭痛目眩。此乃觸經感冒也。依本方。去干姜。加羌活。獨活。牛膝。姜葱煎服。

陳皮　干姜　肉桂　當歸　枳殼
白茯　麻黃　甘草　厚朴　半夏
桔梗　白芷　芎藥　蒼朮　川芎加姜三片

經水不順。或腹痛白帶。或淋瀝不止。或肌瘦者。此氣血俱虛也。宜大補經湯。治婦人血氣虛弱。血海寒冷。經水不調。或時心腹疼痛。或下血帶。如魚腦髓。或似水泔。不分信期。每日淋瀝不止。面色痿黃。四肢無力。頭目眩暈。肌體羸瘦。

當歸　白芍　香附製　川芎　熟地
白朮　茯苓　黃芪　陳皮　肉桂
玄胡　人參　砂仁　阿膠　小茴香酒炒
粉甘草炙　右藥加黑棗三枚。溫服。

煮附丸。治婦人室女。一切氣血經候不調。臍腹疼痛。面色痿黃。心悚乏力。腹脹脇痛。頭暈惡心。飲食減少。崩漏帶下。大腸便血。結聚癥瘕。幷皆治療。若以其名。人人言之。耗氣不喜。此藥也。世訛之已久。不肯服者甚多。殊不知獲效非常。方書所載者。香附子爲婦人之仙藥。不可輕忽。修制相感。豈可同日而語哉。能久服之。自顯其功耳。

香附子不拘多少。先搗毛皮。好醋煮半日。取出焙干。研爲末。醋糊丸。如桐子大。每服五六十丸。米飲湯送下。不拘時候。婦人素墮胎。由氣不下降。所以胎不

固。此藥尤妙。

加味艾附丸。　治婦人經水不調。小腹時痛。赤白帶下。子宮虛寒。

艾葉四兩醋焙干　當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　熟地二兩姜汁炒

玄胡索二兩　生甘草八錢

右藥爲末。水糊爲丸。如梧子大。每服七八十丸。空心米湯下。

烏骨雞丸。　治血海虛寒。乃無子嗣。數經墮胎。皆因衝任之脉虛損。胞內宿挾疾病。經水不時。暴下不止。月內再行。或前或後。或崩中漏下。三十六疾。小便濁。并帶。此藥能治產後百病內。常服。除宿血。生新血。令人有孕。生子充實。及活腰胯疼痛。

人參三兩　生地五兩　當歸六兩酒洗　宮桂三兩

茯苓三兩　黃芪六兩　川芎三兩　白朮一兩麩炒　續斷二兩酒洗

香附十二兩　芍藥二兩　石斛二兩酒浸　烏藥二兩炒　杜仲二兩姜汁炒
地骨皮三兩

右爲末。用烏骨白鷄。或烏骨黃雞一隻。男用雌。女用雄。將鷄籠住。用黃芪二兩爲末。和炒麪一兩。和勻。水爲丸。如豆大。喂鷄服盡。將鷄吊死。肚腸洗淨。摋毛擋骨。碎入前藥於雞腹內。用酒醋各五斤。浸。火煮爛。取骨搗爛爲細末。爲煮鷄藥汁。和麪糊。加酒醋打勻。同藥末杵搗一二百。爲丸。每服八十丸。用溫酒吞下。或米湯。或艾湯亦可。每藥末一斤。用白麪四兩打糊。

龜肉丸。治瘦怯婦人虛寒者。用之極應。

川芎二兩　當歸二兩　白芍二兩火煨　紫蘇八錢去梗
砂仁二兩　花椒二兩取半爲末　艾葉二兩酣炙焙干　香附酒便浸
陳皮二兩去白　熟地二兩酒浸杵膏　干姜五錢炒　五味三錢去梗　人參六錢　白朮二兩麩炒

用黃皮龜肉一斤八兩。湯泡去皮。連爪。用好酯酒各一碗。漠爛如泥。焙干。和前藥爲末。將棗煮爛。入姜同煮。去皮核。去姜。杵膏。和地黃膏爲丸。如梧子大。每服七八十丸。或米湯。或温酒送下。

南嶽夫人濟陰丹。治血海虛冷。久無孕育。及數經墮胎。一切經候不調。崩中漏下。積聚諸症。並皆用之。

桃仁（去皮尖）　人參　桔梗　藁本　甘草
石斛（酒蒸各七錢）　木香　茯苓（各七錢）　當歸　川芎
干姜（炒）　細辛　丹皮　川椒（去目炒）　川斷（各七錢）
京墨（燒酒淬五錢）　蠶布（煅五錢）　山藥一兩　澤蘭一兩　蒼朮（二兩炒）
糯米（三合炒黃）　熟地二兩　香附（一兩七錢）　烏豆（三合發芽去殼炒黃）

右爲末。棗煉爲丸。如梧子大。每服七八十丸。或空心温酒送下。或米湯、酯湯

等送下。或酯打成丸亦可。

四順理中湯。　調理女子婦人風虛冷勞。一切氣血之疾。及胎前產後。血帶血暈。惡露不快。敗血爲疾。並宜服之。凡生產之後。卽便第二口。可以嘗此藥。逐敗血。新血安。自然百病不生。此方常用調理種子。百發百中。悉得効驗。若將調理女人諸病。煉蜜爲丸。或以酒煮麪糊爲丸。服時隨症用湯。

乾姜二兩 炒　香附去毛淨十兩 童便炒　生地二兩 酒浸　黑大荳一升炒熟去皮

右爲末。每服二錢。食前用温酒服。或蜜丸。或酒糊丸。如梧子大。每服八十粒。非温酒。則米湯送下。　若是新產敗血不散。兒枕塊硬。疼痛者。童便和酒送下。　若是臨產。胎死腹中。不下。以黑豆一合。酯煮荳熟爲度。調藥七分。盞服。煖其胎。卽自下矣。　如臨產之時。胎衣不下。以小子童便同煎。酒下。　如產後惡露不快。血暈冲心。眼黑昏悶。口噤不省人事。並用温酒調下。若稍重。可

用秤錘燒紅淬酒下　如婦人初受胎時胎氣不安多臥少起飲食不進名惡阻以煉蜜爲丸如彈大每服一丸細嚼用糯米煎湯送下　如胎漏下血不止或下黃赤汁腹腰重痛以溫酒嚥下兼以膠艾湯安胎飲妊娠數經墮胎多至半產漏下用溫酒下　如妊娠日月未足而一向似欲產者以知母煎湯下　如妊娠胎上逼心胎不近下川芎湯下　如妊娠至七八個月常服養胎益母安和子臟易產以枳殼糯米煎湯下　如女人血冷面白脫色青筋逆露以酒服良驗　如調養經候滋養少女名金釵煎湯經候不調月水淸濁腹常刺痛及產女血弱陰機經脉不勻並依前溫酒米湯下　有一等少女經水已行一二次復至一二年又不行或有四季一行有三五个月復至此本血脉素弱未統故經水斷續宜以此藥調理潤血血旺自通不必攻之

養心益腎百補丹。補益元氣。培塡虛損。眞精內乏。以致胃氣怯弱。下焦虛憊。及夢泄自汗。頭暈目黑。耳鳴。四肢无力。補養之勝藥也。其功不能盡述。

淮生地八兩酒蒸另杵爲膏　枸杞子四兩酒浸　山藥四兩　丹皮三兩去木　茯苓三兩乳蒸

山萸肉四兩酒蒸　柏子仁二兩炒　覆盆二兩　澤瀉二兩去毛　五味子二兩

兎絲子三兩水洗淨酒蒸爛研餅焙干又研細末

右共爲末。用蜜八兩。鹿角膠一兩。先溶入蜜。煉入浮小麥粉四兩。芡實粉四兩。水調。亦入膠蜜同煉熟。和諸藥杵千餘下。丸如子大。每日空心百丸。淡鹽湯下。

經閉不調門　附方一十一道

月水閉絕不行者。何也。夫月水久閉不行。因風冷溶于胞絡。或醉以入房。或爲血枯。及血癥血瘕。或墮墜驚恐。皆令月水不來也。病源云。血性得熱則宣流。得

寒則閉塞既爲風冷所搏則血結於內故月事不通也或醉以入房則內氣耗損致傷肝經使月事少衰肝藏血勞傷過度血氣枯竭於內也或吐血或下血謂之脫血使血枯於中月事不來津液耗減故但益其津液經自下矣月水不行久則爲積塊爲血癥爲血瘕名曰血聚以使榮絕於內水血相併壅澁不通脾胃虛弱更爲水腫者有之心主行血墮墜驚恐神無所依而血散亦令月水不行也蓋人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者也有室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色失散女子則月水先閉何以致然憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾氣虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿傳五臟傳遍故不能卒死者然終死矣蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易志意用藥扶持如此

則可得于九死一生矣。

經候不通。不可一例而用藥。有血壅而不行者。用破血之藥而自通。有血枯而不通者。乃氣血虛敗。如索金於乞丐之手。其可得乎。若用破血之藥。非惟不能行。反愈損其人矣。

治血枯而不行者。滋而通之。

人參　五味　黃芪　當歸　川芎
白芍藥　淮熟地　肉蓯蓉
右藥空心服。

治血壅而不行者。決而行之。

當歸　川芎　赤芍　三稜
莪朮　鬼箭　蘇木　紅花　桃仁
丹皮　白朮　姜黃　玄胡索

右用酒一鍾。煎半鍾。空心服。

養胃勝金湯　治婦人女子。經脉不行。多有脾胃損傷而致者。不可輕用通經破血之藥。則宜補養脾胃。脾胃旺則能生血。而經自行矣。

黃芪　白朮　茯苓　甘草　芍藥
陳皮　麥芽　川芎　柴胡　當歸

右藥空心服。

滋血湯　治婦人血熱氣虛。經候澁滯不通。至使血聚肢體麻木。渾身疼痛。煩倦。或室女年經及笄。經脉不通。日漸黃瘦。將成勞疾。切不可便投紅花破瘀等藥。他日爲患也。若是前症。憎寒發熱。五心煩燥。飲食減少。宜服此藥。滋養而通利之焉。

馬鞭草　荊芥穗　桂心　枳殼　川芎

當歸　赤芍藥　牡丹皮　右用水二鍾。烏梅一个。煎服。

紅花當歸散。治婦人血海枯竭。或積瘀血。經候不調。或斷續不定。時作腹痛。腰胯重疼。攻刺小腹緊硬。及室女月水不通。並宜治之。

紅花　紫葳　牛膝　白芷　蘇木　桂心　歸尾　甘草　劉寄奴　赤芍藥

右水二鍾。酒一鍾。共煎一鍾。空心服。

柏子仁丸。治婦人血虛有火。月經耗損。漸至不通。日漸羸而生潮熱。愼毋用毒藥通之。惟此丸主之。

柏子仁一兩另研炒　牛膝一兩酒拌　澤蘭葉三兩　續斷二兩　熟地三兩杵膏　卷柏一兩生于石岩上遇雨則舒如掌逢日則卷如掌宜生用

右爲末。入地黃膏。煉蜜丸。如梧子大。空心米湯送下十丸。

澤蘭湯。治症仝前。

澤蘭葉三兩　當歸一兩酒拌　芍藥酒炒一兩　甘草五錢

右藥每服五錢。水煎。空心温服。

加味地黃丸。治婦人經閉發熱。或咳嗽等症。

熟地四兩　山藥二兩　白茯苓一兩五錢　丹皮一兩五錢　澤瀉去毛一兩

當歸一兩酒拌　香附童便製一兩　桃仁去皮尖一兩　山萸肉去核淨肉四兩　土紅花一兩

右藥爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。空心温酒下百丸。或鹽湯下。愚常以加味地黃丸。並柏子仁丸。合作一劑。煉蜜爲丸。神效。

通經丸。治室女婦人。經脉不通。臍腹疼痛。潮熱。或成痕等症。

川椒炒去目　蓬朮煨　乾漆炒烟盡　乾姜泡　大黃酒蒸

桂心　桃仁　川烏各七錢　當歸一兩　青皮一兩炒

紅花七錢　紫葳七錢　牛膝七錢　劉寄奴七錢

右藥爲末。將一半藥用米醋熬成膏。和前餘藥末一半。用石器內杵二三百下。丸如梧子大。陰干。每服五十丸。空心温酒醋湯送下。

紅花當歸丸。治婦人血臟虛竭。經候不調。或斷不來。積瘀成塊。腰腹刺痛。肢體羸瘦者用。

馬鞭草八兩　劉寄奴八兩熬膏爲丸　當歸三兩　赤芍

川芎　香附醋炒　丹皮去皮　甘草各一兩五錢　牛膝酒拌

白芷各七錢　官桂六錢　紫葳　蘇木各三兩　紅花　枳殼炒一兩

右藥爲末。以前膏入小糯米粉。打糊爲丸。如梧子大。每服八十丸。酒紅花煎汁。空心送下。

取經丸。治婦人經閉。不論久新。

乳香去油　沒藥　兒茶　巴豆去殼　蔥白各五錢
斑毛五個

右藥共爲末。搗丸。綿裹三層。擊放竹筒上。將綿繫住。送入陰戶三四寸許。候灶香時。經水立自下矣。

■經漏血崩門 附方十三道

夫婦人月水不斷。或崩中不止者。由損傷經血。衝任脉虛故也。衝任之脉。爲經脉之海。手太陽小腸之經也。手少陰心經也。此二經爲表裏。主下爲月水。若無損傷。則陰陽和平。而氣血調適。經下依時。若動勞太過。多致臟腑俱傷。而衝任之脉虛。不能約制其經血。故令月水不斷。或忽然暴下。謂之崩中。凡血脉不止。而合陰陽。則冷氣上入於臟。令人身體面目痿黃。亦令絕子不產也。若診其寸口脉微遲。尺脉微弦。寸口微遲。爲寒在上焦。但吐爾。尺脉微弦。卽小腹痛。引腰

脊痛者。血必下也。

斷下湯。治婦人衝任氣虛。崩中漏下。經脉不調。每遇月候將來。臍腹腰脚先痛。漸減飲食。四肢乏力。及帶下。卅六條。悉能療之。

人參去蘆　熟地　艾葉酌炒各一錢　海螵蛸燒灰　當歸各二錢
川芎七分　干姜炒五分　阿膠炒七分　食後服。

膠艾湯。治勞傷氣血。月水過多。淋漓漏下。連日不止。臍疼腹痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。或勞傷胞絡。胞漏下血。腰痛悶亂。或因傷損胎下。搶心奔衝短氣。及因產乳衝任氣虛不能約制。延引日月。漸成羸瘦等症。

熟地一錢　白芍藥一錢　當歸一錢　艾葉炒一錢　阿膠炒
川芎炙各七分　水鍾半。酒半鍾。煎八分。食前服。

涼血地黃湯。治婦人血崩不止。腎水陰虛。不能鎮制胞絡相火。故血走而崩

也。

生地　歸尾　黃連　黃栢　知母
棗本　川芎各四兩　紅花一分　柴胡　防風
羌活　黃芩　細辛　蔓荊子各二分　荊芥
甘草炙各二分

右劑。食後服。

升陽除濕湯。治胃氣下陷。經血暴崩。並治白帶淋瀝。此風能勝濕之意也。又云火鬱則發之。

當歸　獨活各五分　蔓荊子　甘草炙各一錢　升麻
藁本　羌活　蒼朮　黃芪各一錢　柴胡一錢

右藥空心服。婦人陰脫下墜。用此藥以升提之。亦多有效。

加味荊芥止崩湯。治血崩日久不止。

當歸　甘草　陳皮　枸杞子　熟地
白朮　荆芥穗燒灰　人參　白芍藥
右劑水煎服。此盧水西實驗良方也。

備金散。治血崩不止。
香附四兩　歸尾一兩二錢　五靈脂炒一兩　共爲末每服二錢空心溫酒送下

解毒四物湯。又名温清飲。治婦人經絡不住。或如萱汁。五色相雜。面色痿黃。
臍腹刺痛。寒熱往來。崩漏不止。並宜服之。
當歸　川芎　芍藥　熟地　黃連
黃芩　山梔各一錢五分
右劑。水一鍾半。煎八分。空心服。

五灰散。治經血不止。或血崩者用。

蓮蓬殼　黃絹　血餘　百草霜　棕皮

右各燒爲灰。加黑山梔炒蒲黃京墨血竭共爲末。調入前藥服之。或煉蜜爲丸。每服五十丸。空心清米湯下。

血崩甚而腹痛。人多疑惡露未盡。大凡血之爲患也。欲出未出之際。停住腹間。即成瘀血。必待瘀血盡而後截之。吾恐併與人而俱無矣。腹痛血通則止。崩而腹痛血住則止痛。宜

川芎當歸湯。　加乾薑炒黑　熟附子各一錢　止其血而痛自定矣。

滋陰百補丸。　治血崩日久。白水淋瀝不止。用此藥以補益之。及婦人年過五十而經血過多者。用此藥屢效。

香附四兩新汲水浸自辰至酉取起晒干用之　破故紙炒一兩　山藥酒浸一兩

杜仲姜汁炒一兩　荆芥穗炒焦一兩　當歸一兩五錢　白茯苓二兩去皮　香附四兩小便製

續斷乙兩

右爲末。米糊爲丸。空心米湯下。更加人參五錢尤妙

經驗固崩丸湯。治血崩不止。徬徨之甚。

當歸　川芎　白芍酒炒各一錢　熟地八錢　杜仲
川斷　山藥各一錢　升麻　甚者倍用　地榆
山梔炒黑　荆芥炒黑各一錢五分　干薑炒黑倍用　右藥照分稱足。水煎。空心服。

清塊止暈湯。治血崩有至昏眩。不省人事者。急用此藥。清血行經。而暈自除矣。

澤蘭葉　荆芥穗炒焦　川芎　人參　甘草各一錢

右劑用水一鍾半。酒少許。煎服。

芎歸湯。治血山崩。以致寒所暈倒者。急用此藥煎服。

當歸五錢　川芎四錢　白芍酒炒二錢　續斷三錢　荆芥穗炒黑三錢

右劑用水一鍾。酒半鍾。煎服。立止。或加人參二錢。

■赤白帶門 附方八道

婦人赤白帶下者。皆因月經不調。房色過度。或產後血虛。胃中濕痰下流。滲入膀胱而帶也。腰酸、頭暈、眼花、小腹脹痛。四肢無力。困倦而虛。肥人多痰。有帶症。瘦人多火。亦有之。帶與夢遺同治。

加減八物湯 治赤白帶下。

當歸　川芎　白芍酒炒　生地
白朮去蘆　茯苓去皮　山藥　杜仲酒炒　人參
甘草減半　烏梅一只　香附炒各等分

右加薑棗火煎。食前服。肥人加半夏。瘦人加黃栢。飽悶、去人參。加砂仁。腹痛、加小茴香。玄胡索。去人參。冬月、加煨薑少許。

止帶丸。赤白同治。

牡蠣火煅　破故紙酒炒　川斷酒拌　椿皮此藥能大治白帶酒炒各等分

香附醋炒　青黛減半　杜仲姜汁炒　山藥　人參

川芎　當歸各等分

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。空心清米湯送下。腹痛加玄胡索。去人參。又加小茴香。飽悶去人參。加砂仁。夏月加黃栢。冬月加乾薑少許。肥人加製半夏。瘦人加酒黃栢。

加味威喜丸。治帶如神。

白茯苓去皮四兩切碎同朱砂二兩煮半日去朱砂　牡蠣二兩　黃蠟二兩

右將黃蠟溶化。加蜜煉爲丸。如梧子大。每服八十丸。空心清湯送下。白濁亦同此治之。

當歸煎。治赤白帶不止。腹內疼痛。四肢煩疼。不用飲食。日漸羸瘦。

當歸酒洗浸　牡蠣火煅　阿膠炒　白芍藥炒酒　續斷酒浸各一兩
地楡五錢　白茯苓　荆芥炒黑一兩

右水煎服。或爲末。酯糊爲丸。每服五十丸。米湯送下。

加味六合湯。治婦人上有痰火。下有白帶腹痛。

當歸一兩　白芍炒八錢　川芎鹽水浸七錢　熟地酒浸焙干一兩　炙甘草四分
陳皮去白鹽水浸八分　白茯苓七分　半夏姜製七分　白朮去蘆一錢　黃柏酒炒七分
知母酒炒六分　椿皮酒炒一錢　貝母去心糯米拌炒七分　加薑三片。空心服。

收帶六合丸。治赤白帶下。腹肚疼痛。和脾胃。燥中宮之火。提下陷之氣。化痰清火。

白朮米泔浸炒　蒼朮米泔浸炒　白茯苓去皮　陳皮鹽水浸去白　當歸

白芍藥酒浸各二兩　熟地酒浸　製半夏　椿皮酒洗焙一兩半　丹皮
黃栢酒炒各一兩二錢　炙甘草一兩　防風九錢　升麻八錢
右共爲末。酒糊爲丸。每服百丸。空心或米湯或鹽湯送下。一方加香附枳殼。

雙白丸。治白帶如神。
眞石灰二兩　白茯苓四兩去皮　共爲末。水丸。每服五十丸。空心白湯下。

白芷螵蛸丸。治白帶如神。
白芷炒黑一兩　海螵蛸三个煅　胎髮一團煅　共爲末。空心酒下。每服三錢。

虛勞門附方一十一道

虛勞者。因氣結。憂思驚恐。或情慾動心。或經水不調。變生諸疾。上盛下虛。脚手心熱。或皮焦骨蒸。或午後怕寒。夜間發熱。或日夜不退。盜汗自汗。減食糟雜。怔忡嘔噦。煩燥。胞腹作疼。飽悶作瀉。痞塊虛驚。面白唇紅。頭目昏暈。腰背痠痛。四

肢困倦無力。小水赤澁。重則虛火上攻。兩頰顴赤。骨蒸勞熱。陰虛火動也。治宜。養血。健脾以治其本。降火清鬱以治其標。逍遙散。茯苓補心湯。選而用之。妄勿輕投。

清肺飲　治婦人虛勞熱發。咳嗽吐血。先服此清熱止血。後服逍遙等劑。加減而調理之。

當歸　川芎　黃芩　貝母去心　知母蜜水炒
阿膠珠炒成　生地　蒲黃炒　陳皮各一錢　白芍藥酒炒
天門冬去心　前胡各一錢　藕節小片　炙甘草三分

右劑食前徐徐温服。

虛勞熱嗽有汗者。用逍遙散亦宜。

逍遙散　治肝脾血虛發熱。或潮熱。或自汗盜汗。或頭痛目澁。或怔忡不寧。頰

赤口乾。或月經不調。或肚腹作痛。或小腹重墜。水道澁痛。或腫痛出膿。內熱作渴。悉宜服之。

當歸　白芍藥酒炒　白朮土炒　白茯苓　柴胡酒炒各一錢

薄荷少許　炙甘草五分　右劑煨薑一片。煎服。有加丹皮、山梔炒名加味逍遙散。治症同前。

滋陰至寶湯。治婦人諸虛百損。五勞七傷。經脉不調。肢體羸瘦。此藥專調經水。滋血脉。補虛勞。扶元氣。健脾胃。養心肺。潤咽喉。清頭目。定心神。安魂魄。退潮熱。除骨蒸。止喘嗽。化痰涎。收盜汗。住泄瀉。開鬱氣。利胸膈。療腹痛。解煩渴。散寒熱。祛體痛。大有奇功。不可盡述。

當歸　白朮　白茯苓　白茯苓　陳皮

知母　貝母去心　香附便浸　地骨皮　麥門冬去心各八分

薄荷少許　炙甘草三分　柴胡酒炒　加煨薑三片。水煎温服。

虛勞熱嗽無汗者。

茯苓補心湯　婦人以血旺氣衰爲本。心生血。肝藏血。今血衰而氣盛者。由心氣虛耗。不能生血。又不能制乎肺金。使肺氣得以乘乎肝木。肝臟虧損。不能藏血。漸至枯涸。不榮經絡。故月信不調矣。此藥當補心元之虛。折其肺氣之盛。調和榮衛。滋養血脉。其疾自愈。兼治氣血過多。虛勞發熱。後吐血衄血。咳嗽痰喘上壅。胸膈不利。

當歸　川芎　白芍炒　熟地　陳皮

半夏製　白茯　乾葛　桔梗去蘆　枳殼麩炒

前胡去蘆各一錢　紫蘇七分　人參　木香各五分

右劑加薑棗煎服。

滋陰地黃丸。治婦人經水不調。或不通。虛勞。吐血衄血。咳血便血。發熱咳嗽盜汗。痰喘心慌一切虛損瘦怯之病。

熟地 姜汁浸焙四兩　山藥二兩　山茱萸 酒蒸去核二兩　白茯苓 去皮一兩五錢　丹皮 去骨一兩五錢

生地 酒浸二兩　貝母 去心二兩　澤瀉 去毛一兩五錢　天門冬 去心二兩　知母 去毛酒炒二兩

當歸 酒洗　香附 便浸炒二兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服百丸。空心鹽湯下。痰嗽。薑湯下。

烏骨鷄丸。黃皮龜肉丸。南嶽夫人濟陰丹。

養心益腎百補丸。已上四方。俱在經候不調門。可選用之。

抑肝散。治寡居獨陰。婦人惡寒發熱。全類瘧疾者。久而不愈。卽成瘵矣。

柴胡三錢　赤芍　丹皮 各一錢五分　青皮 炒二錢　當歸五分

生地五分　地骨皮一錢　香附 便炒一錢　川芎七分　連翹五分

山梔炒一錢　炙甘草三分　神麯八分　空心服。渣下午服。臨臥服交感一丸。即交感丹。

鉄公先生交感丹。治先富後貧。先貴後賤。或終身不得志。抑鬱不快。及婦人以七情鬱結。師尼寡婦鬱抑不開。

香附一斤童便浸高一指待七日洗淨晒干搗碎醋炒　白茯苓去皮木淨四兩人乳浸日晒夜露七日七夜

右二味爲末。煉蜜七分。神麯七分。打糊和丸。如梧子大。每服一丸。不拘時。白滾湯送下。

■求嗣門　附方九道

凡女人經水來時。有兩日半淨者。三日淨者。亦有女人血旺氣盛。六七日淨者。不可拘定。但觀寶田。看經水之顏色何如耳。乃以潔白之物。或絲或帛。夾於陰戶。取而觀之。金色者。乃佳期也。鮮紅者未淨。不及也。淺紅者太過也。惟以敗血

去淨。新血已生。如金色者。爲佳期也。此時合交。無不成孕矣。若先期而交者。縱使施精。乃金水太盛。子宮淤塞。且無受精之處。後期而交者。子宮已閉。雖施精而無門可入。胎豈有成也哉。所謂佳期者。敗血已淨。新血復生。子宮虛。此時施精。如爐。煉金。如漿。點。腐胎孕。自成矣。又經云。經水淨單日下種則成男。雙日下種則成女。六日以後不成矣。施精亦要在夜半子時候。方可也。蓋子時候。夜氣清明。一陽發生。古語。一陽動處興功是也。此時再遇天晴月朗。風清氣和。又是成定吉日。又逢天月二德合日。行房不惟生子而子且貴。神氣清秀。聰明必過人矣。○胎既成矣。則陰陽之精。渾融一氣。但精血薀嫩而未老。動之易剋易化。第恐風邪感入。損傷胎氣。切記。不可復後連交。挾持重物。過險超壑。深怒大笑。大驚高語。是何也。蓋以胎陰之結。一月如白露。二月如桃花。三月之後分男女。當靜以守之。逸以待之。故曰。靜而常是也。若連交一次。胎息反被搖動。感受風

邪。入於子宮。譬如果木花開。若遇風寒霧露。花定不能結果。縱有結成。亦必生蟲風落。結胎後若要連交。亦必不能以成子矣。縱有一成。亦不能結實元眞。非小產卽臍風。非生蟲落巢而何。將產若連交。則胎受毒穢。產後滿頭生瘡。有必然矣。愼之愼之。○婦人之道。始於求子。求子之法。莫先調經。每見婦人之無子者。其經必或前而或後。或多或少。或將行而作痛。或行後而作痛。或黑或紫或淡或凝。而不調。不調則氣血乖爭。不能成孕矣。大抵婦人無子多因氣血俱虛。不能攝養精氣故也。肥人多痰軀脂滿溢。閉塞子宮。治須消痰養血順氣。瘦人多火。子宮乾燥無血。治宜清熱補血。術豈多乎哉。

調經種子方　調經種子。百發百中。

當歸　川芎各四錢　熟地六錢　香附炒六錢　白芍酒炒三錢　陳皮三錢　白茯苓三錢　吳茱萸炒四錢　丹皮　玄胡索炒各三錢

若遇期而經水色淡者。乃血虛而有寒也。加官桂、乾薑、熟艾三錢。

若先期三五日而經水色紫者。加條芩三錢。

右作四劑。每劑用薑三片。空心服。渣臨臥服。待經至之日。服起。一日一服。藥盡經止。則當交媾。卽成孕矣。從未成孕。經爲對期。俟經再來。卽服四劑。必有孕無疑。

百子建中丸

治婦人久冷。赤白帶下。肚腹疼痛。經水不調。四肢无力。久鮮子息。温中煖臍。調經開鬱。開胃服至半月。必有孕矣。

香附 一斤分作四分一分童便浸七日一分酒浸七日一分醋浸七日一分鹽水浸七日各用炒香　大艾葉 四兩米醋浸七日將米醋漫火煮半日焙干爲末

砂仁 五錢　淮熟地 酒浸三兩　白芍藥 三兩　玄胡索 一兩五錢　五味子 五錢

杜仲 酒炒一兩　阿膠 炒一兩五錢　白朮 一兩麪炒

右爲末。用壬子日。好米醋打粳米糊爲丸。如梧子大。空心時用淡醋湯送下。

八十丸。如婦人肥胖者。加陳皮半夏各一兩。此方慈水葉南洲三代以此得子。屢試屢驗。

女金丹　調經種子。眞神方也。

白芍藥　當歸　川芎不見火　石脂赤白皆可　藥本

人參　白薇　丹皮　桂心　白芷

白朮　白茯苓　玄胡索　沒藥　甘草各等分一兩

右十五味。除石脂沒藥另研。其餘皆以醇酒浸一宿。濾起烘干。爲細末。殼砂十五兩。香附米十五兩。以米醋浸一宿。略炒爲細末。足十五兩。右十六味和合。重羅煉蜜丸。如彈大。每服取一丸。空心鷄未鳴時。先以茶湯漱口。後細嚼。以溫酒或白湯送下。乾物壓之。服至四十九丸爲一劑。以癸水調平。受胎爲度。胎中三日一丸。產後二日一丸。百日止。盡人事而不育者。天也。此方治婦

人久虛無子。及胎前產後。一切病患。男子積年血氣。手脚痲痺。半身不遂。併婦人血崩帶下。產後腹中結痛。吐逆心痛。諸虛不足。腹痛並治。

五子六味丸。 卽經候不調門。養心益腎百補丸也。男婦俱可服。

烏骨鷄丸。 補虛極贏。種子亦妙。

南嶽夫人濟陰丹。 治三十六疾。吾祖藉之以起家。調經補虛。種子神驗方。珍之珍之。

黃皮龜肉丸。 虛寒者服之。種子亦效。

四順理中湯。 調經中子。百發百中。

已上五方。俱載在經候不調門。可參看之。

固本健陰丹。 凡人無子。多是精血清冷。或賦稟薄弱。間有壯甚者。亦是房勞過甚。以致腎水欠旺。不能直射子宮。故令無子。豈可盡歸罪於母血之不足

與虛寒也耶。

兎絲子酒煮一兩五錢　白茯苓　山藥酒蒸　牛膝去蘆酒浸　肉蓯蓉酒浸

歸身　杜仲去皮酥炙　五味子去梗　益智仁鹽水炒　鹿茸酥炙各一兩

熟地酒蒸　山茱萸酒蒸去核各三兩　川巴戟酒浸二兩去心　續斷酒浸　遠志肉去骨姜炒

加人參二兩　枸杞子三兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服八十丸。空心鹽湯送下。酒亦可。臨臥再進一服。若婦人月候已盡。此時種子期也。一日可服三次。無妨。如精不固。加龍骨牡蠣。火煅過。鹽酒和淬三五次。各一兩五錢。更加鹿茸五錢。尤妙。

■妊娠門　附方五十三道

產前當清熱養血。產婦因火動胎。逆上作喘。急者。急用條芩香附類。墮胎者。乃氣虛而且血熱。黃芩安胎。乃上中二焦藥。能降火下行。懷妊受物。乃一臟之虛。

假如肝臟虛。不能榮其肝。肝虛。故受酸物。產前安胎。白朮條芩爲聖藥也。俗人不知。以爲寒而不敢用。不知胎前宜清熱。令血循經而不妄行。故能養胎。有孕八九個月。必須順氣。須用枳殼紫蘇梗之類。經脉不行。已經三月。尺脉不止者。則是胎也。

驗胎散　川芎爲末。每服一錢。空心艾葉煎湯調下。覺腹內微動。則是胎也。若服後不動者。非胎也。是經閉也。

胎前諸疾及調治方法　婦人一覺有孕。當清熱養血爲主。內經云。妊婦者。諸症之來。無犯三禁。弗傷胃氣。三禁者。汗吐下是也。謹以逐月調治之法。與方例後。

懷妊一月。血凝。足厥陰肝經養之。無他症。不宜服藥。如有不安。當服主方。

白朮（二錢微炒能養胃清痰）　條芩（一錢五分微炒能清胎中之熱降火消痰）

右以水煎服。或爲末。米湯調下一匙。如少血。加歸身一錢五分。懷妊二月。爲藥足少陽膽經養之。多有血氣不足。胎氣始盛。逆動胃氣。惡阻嘔吐。不進飲食者用。

陳皮鹽水炒　茯苓　枳殼炒　人參五分　蘇梗

甘草五分　半夏姜製　條芩淡姜汁炒各一錢　加薑三片。煎服。

參橘散。治婦人妊娠二三月。惡阻吐逆。不食。心虛煩悶。

人參　陳皮去白　茯苓各三錢　麥冬去心　白朮

厚朴鹽水拌　炙甘草各一錢　右作一服。薑七片。竹茹少許。不拘時服。

安胃湯。治惡阻。惡心阻爾飲食也。

當歸　白芍藥煨　陳皮　香附炒

半夏姜湯泡香油炒　茯苓　藿香　神麯　砂仁各等分

甘草減半　加薑三片棗一枚溫服。

懷妊三月陽神爲魂手厥陰胞絡經養之如惡阻不止飲食不進前方爲主煎下抑青丸前條第一方也。

川黃連姜汁炒二三日進一服　爲末水糊丸如綠豆大每服二錢。

如服二方仍惡心湯水不進及大便燥結小便短少是爲陰氣在上陽氣下陷當以木香檳榔丸導其陰氣歸下吐止藥止不可多服以其戕陰道也三四日進一服。

木香五分如吐重換沉香三分　檳榔五分　青皮　黃栢　我朮

枳殼　黃連　陳皮　香附　黑丑末各五分

大黃末一錢　當歸一錢

共爲末和丸滴水爲丸如菉豆大時時清湯送下二三丸吐止大半卽住不

可多進。恐損胃氣故也。

懷妊四月。陰靈爲魄。手少陽三焦經養之。無他故。則止藥。如覺倦臥不安。或口頭痛。脚腫。弱卽服

白朮炒一錢五分　陳皮鹽水炒八分　炙甘草五分　條芩煨一錢　香附鹽水炒八分

白茯苓一錢　歸身一錢五分　白芍煨一錢　川芎煨五分

右作一服。水煎二次服。熱多。加炒山梔一錢。

懷妊五月。分五臟。足太陰脾經養之。如覺胎脹腹重。睡臥不安。當服養胎飲子。五日一服。

歸身二錢　川芎八分　芍藥一錢　白朮一分五分　條芩八分

枳殼八分　澤瀉一錢

懷妊六月。六腑。足陽明胃經養之。如覺胎氣不安。或脹滿。或微動。或胎動不

安。當服大安湯飲子。六日一服。

白朮　茯苓　條芩　砂仁　桑寄生
當歸　甘草加減隨症

右劑作二帖。水煎溫服。

懷妊七月。七情開發。手太陽肺△經養之。如覺胎氣不安。或損傷漏血。或腹大重墜。宜清胎萬金飲子。

白朮　川續斷酒炒　荊芥穗炒焦　茯苓　炙甘草

服二次。

安胎飲。治妊娠惡阻。嘔吐不食。胎動不安。或時下血。

川芎　白朮　茯苓　熟地酒蒸焙　地楡
當歸　半夏泡姜汁炒　白芍　阿膠炒成珠　黃芪

炙甘草　加薑三片。食遠服。

懷孕八月。八景神具。手陽明大腸經養之。如覺腹大。妊婦氣喘。不問有無外感。宜服束胎調氣飲子。七日一服。

條芩　茯苓　蘇梗　白朮　陳皮　枳殼　甘草

懷妊九月、併十月。氣足而成象。足太陽膀胱經養之。雖無他故。亦宜順氣安胃。使无臨產之患。宜服之可也。

順胎和氣飲。八九日服一帖。

當歸　白朮　條芩　滑石　芍藥　大腹皮　右劑服二次。　蘇梗

妊娠臨產之月。宜服滑胎飲子。十個月服

當歸　白芷微炒　甘草　川芎　香附
白朮　陳皮　條芩　蘇梗
如氣虛。加人參。如胎肥。加枳殼。
已上十個月。調理之法。彰彰明白。務皆檢閱。對症用之。無不效驗。又有十個月中。變症併例方於左。

一、懷孕自墜。蓋有氣血虛損。不足榮衛。猶枝枯果落。籐瘦花殘。又有勞傷致落。皆宜固養氣血。大加補益。自然安矣。主方、

安胎加味八物湯。

人參　條芩　阿膠　桑寄生
芍藥　續斷　白朮　當歸
水煎服　熟艾

十聖散。小產一症。多因本婦氣不足。胎無所榮。血不足。胎無所養。榮養失宜。猶樹枝枯而果落。豈不傷枝墜葉乎。其間飢飽勞逸。惱怒憂思。致傷子宮。須量輕重而加減治之。此藥性和平。調養氣血。須月服四五帖。方佳。或素有墮胎之患者。宜按方治之。

人參　黃芪蜜炙　白朮炒各八分　砂仁炒五分　甘草三分

淮熟地酒蒸　白芍酒炒　歸身酒洗各一錢　川芎七分　續斷七分

加薑三片。棗三枚。服。

桑寄生散。治婦人妊娠時。或因房室驚觸。勞力過度。動傷胎胞。或食毒物。致令子宮虛滑。經脉淋漓。若不急治。敗血湊心。子母難保。日漸胎乾。危亡不久矣。

桑寄生　當歸酒浸　續斷酒浸　川芎　香附去毛炒

茯神去木　阿膠炒珠　白朮各二兩　人參去蘆　炙甘草各五分
陳皮炒一兩　烏梅去核五錢

右咀每服七錢。水一鍾半。薑五片。煎八分。不拘時服。

獨聖散。　砂仁不拘多少爲末不拘時淸米湯調下一日三服便可

一、懷孕血漏者。是氣血兩虛。腹中溫熱。或爲風邪下陷。血分使然。不必分治。急宜大補淸熱。不然。胎乾不動。奔上沖心矣。宜服

加減固胎飲子。　加茯苓、桑寄生、名安胎飲。

白艾　熟地　川芎　條芩　白芍
阿膠各一錢　白當歸　白朮各一錢五分　甘草三分　如、果氣虛。不能固守者。加人參一錢。如覺有痰下墜者。加升麻三分。製半夏八分。如覺有風者。加荊芥穗一錢。如覺心手熱甚者。加黃芩八分。生地一錢。

川芎湯。治胎漏下血不止。或心脹痛。一服立效。

當歸　川芎各五錢　共作一劑。煎用酒。入童便一盞。同服。

佛手散。治妊娠五七個月。因事藥磕着胎。或子死腹中。惡露下痛不已。口噤欲絕。用此藥探之。若不損。則痛止。子母俱安。若胎損。即便逐下。

當歸六錢　川芎四錢　益母草五錢

右一劑。水煎。入眞酒一盞。再煎一沸。溫服。如人約行五里。再一服。

保胎丸。治屢經墮胎。久而不育者。宜服此藥。過七個月。不必服矣。

白朮炒一兩　條芩炒五錢　當歸酒洗二兩　川芎一兩五錢　杜仲炒一兩

續斷酒浸一兩　陳皮五錢　人參五錢　香附童便浸炒一兩

右爲末。糯米糊丸。如菉豆大。每服八十丸。空心米湯送下。

安胎養血益母丸。懷孕二三個月。即便可服此方。至十個月。俱可服。保養血

氣。五月五日午時。取益母草。一斤陰干取淨末八兩

當歸身二兩　川芎一兩五錢　生地　白芍各一兩五錢　殼砂一兩五錢

白朮炒一兩　條芩一兩五錢酒炒　人參去蘆八錢　阿膠炒珠乙兩

如腹痛。加川斷肉。酒浸乙兩　如有白帶。加椿皮炒乙兩　如漏胎。月月來。見紅者。加荊芥。炒焦乙兩　地榆炒乙兩　右爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服八十丸。空心白湯下。懷孕惡阻者。方見前篇。可檢用之。

懷孕另有盤血塊者。此非胞中之血。乃有餘之血。將入養胎。被風寒所抑。結成大塊。漸漸作楚。與胎無干。可用下丸治之。

海附丸。　香附四兩　海石二兩醋煮　桃仁去皮　白朮各一兩

右爲末。神麯糊爲丸。空心清米湯下五十丸。兩日服一次。壯盛者。一日進一服。

八正湯。治婦妊娠轉胞。小便不通者。當與服之。

甘草　木通　萹蓄　瞿麥　滑石
車前　山梔各一錢　大黃八分　煎服。小便自通而至矣。

五苓散。

肉桂減半　阿膠妙各等分　右劑煎服。立效。

車前子飲。妊娠下焦留熱。小便不通。淋瀝作痛。

檳榔　木通　陳皮　赤芍藥　車前子
赤茯苓　當歸　滑石另研　石葦葉炙去毛

水煎服。以利爲度。未利再服。

婦人有孕。小便不利。小便腫脹。幾至於殆。用八味丸一服。小便淋瀝。再以前丸之料。加車前子一劑。即利。腹肚頓宛而安。

懷孕遍身手足作痛者。皆是溼熱而然。宜用
獨聖散治之。山梔子一合炒爲末。清米湯時時調服。日進二三次愈。

鯉魚湯。治妊娠渾身浮腫。大小便赤澁。
白當歸酒洗　白芍藥各三錢　白茯苓四錢　白朮五錢
右劑每服四錢。用鯉魚一尾。約重一二觔者。破洗鱗腸。白水煮熟去魚。每服魚汁一盞半。生薑七片。陳皮少許。煎至八分。空心服。如胎水不盡。再服自然有效。

木通散。治妊娠身體浮腫。心腹脹滿。小便不通。
木通　桑皮　香茹　木香　訶子
赤茯苓　枳殼　檳榔　紫蘇

葶藶散。治妊娠遍身浮腫。

葶藶　白朮　茯苓　桑皮　郁李仁

煎服以通利爲度。

茯苓湯。治子腫面目浮虛。渾身腫脹。

當歸　川芎　芍藥　熟地　茯苓

澤瀉　白朮　條芩　山梔　麥冬

厚朴　甘草　水煎服。

懷妊脚面上腫至腿者。宜用白朮散。此藥最能消腫除濕。

白朮一兩　陳皮五錢　大腹皮五錢　茯苓五錢　薑皮三錢

右爲末。每服米湯調下。腫退住服。如三四次不退。用天仙藤散。

天仙藤散。

烏藥各等分　天仙藤洗煉　香附炒　陳皮　甘草

木瓜三片　蘇葉三片　生薑三片

右爲末。每服三錢。木瓜蘇葉生薑。共煎湯調服。至腫退則住。

分氣飲。治妊娠七八個月脚腫。

陳皮　甘草　赤茯苓各三錢　木瓜　白朮各五錢　蒼朮

右作一劑。加薑棗水煎服。予用之屢試屢應。

懷妊寒熱往來不一。是氣血兩虛之故。切勿以外感治之。宜用

八物湯。加減予之。

人參五錢　當歸二錢　甘草三分　白朮　熟地

白芍藥　川芎　白茯苓各一錢　右水煎服。如寒多。加人參五分

熱多。加芍藥五分　有痰熱。加貝母茯苓各八分

懷妊心大痛者。非心痛也。是胃脘當心。被寒邪所鬱。氣不通而痛也。只宜服

導赤散。

山梔仁、鹽水炒一錢五分　五靈脂　草荳仁　眞蒲黃炒各一錢

右劑共爲末。酯湯調下一二匙。以痛止爲度。

清熱解鬱湯。治胃脘當心而痛。

山梔鹽水炒一錢黑五分　撫芎一錢　枳殼八分　黃連八分　蒼朮八分

陳皮五分　乾薑五分　香附炒一錢　甘草三分

右劑加薑三片。鹽少許。水煎。食遠時服。

懷孕三四月。胎不動者。非母受異感邪氣所成。却因大寒束住。不動有之。當以佛手散探之。是眞胎必動。假胎反脹而不安。

川芎一兩　當歸七錢　水煎服。或爲末。酒調服三四匙。便知端的。眞胎當保養。假胎宜用黑神散去之。方見後。

懷孕驚悶不安。名曰子煩。此乃二火爲病。宜用

竹葉湯。

竹葉十片　白茯苓二錢　防風一錢　條芩一錢　麥冬一錢五分

水煎服。煩止卽住。

懷孕中風。不省人事。謂之子癇。痰癇。不利。之故也。宜用

羚羊角散。

羚羊角　獨活　棗仁　米仁

五加皮　防風　當歸　川芎　茯神

杏仁　木香　甘草

右劑加薑五片。水煎服。

懷妊小便澁少而頻者。謂之子淋。宜用

安榮湯。

麥冬　滑石　通草各三錢　當歸

人參　燈草各五錢　細辛一錢　甘草五分

共爲末。麥冬煎湯。調下二錢。

豬苓湯。　豬苓　滑石　木通　澤瀉
車前　甘草　麥冬　牛膝　枳殼
扁蓄　瞿麥　黃栢　以水煎服。

懷姙下痢。此是暑熱。寒。溫。相搏而然。宜用加味黃芩芍藥湯。漸漸調理。切勿猛治以損其胎。

當歸　條芩　芍藥　黃連姜汁炒　砂仁
枳殼　檳榔　木香　右藥水煎服。痢止卽止藥。

安胎利氣飲。治胎冷腹脹。痛引兩脇。小便頻數。大便虛滑。

訶子麵煨去核　白朮各一錢　陳皮去白　良薑炒　木香不見火
白芍陳米炒　炙甘草　右將水二鍾。薑五片。煎八分。不拘時服。

懷孕胎氣不和。湊上心腹。謂之子懸。若不急治。禍在目前。母必喘死。宜服

紫蘇飲。胎前諸症。總宜此方加減。

大茯皮　川芎　白芍　陳皮　蘇葉　當歸各一錢　人參五分　甘草二錢

已上加生薑五片。葱白五寸。同煎服。

如腹痛。加木香香附。若咳嗽。加枳殼桑皮。倘熱。加條芩。或嘔。加砂仁。如瀉。加白朮茯苓。或加枳殼砂仁。以水煎。食後服。於八九個月服數十帖。甚得力。夏月加黃芩。冬月不必加。春月加川芎。然有別症。以意消息於後。氣虛加參朮。氣實。倍加香附陳皮。血虛。倍加當歸地黃。形實。倍紫蘇。性急。加黃連。有熱。加黃芩。溫痰。加滑石半夏。食積。加山查。食後易飢。加黃楊腦。有痰。加半夏。腹痛。加木香肉桂。懷孕胎損而子死腹中。母舌督而不能言者。是也。宜加味

黑神散。下其死胎。救其母可也。

歸尾二錢五分　川烏一錢五分　乾薑各一錢　黑豆四十九粒

當門子一分　川芎一錢五分　赤芍　肉桂一錢　水煎。調麝香末服之。其胎必下。然後服。

八物湯。調理之。

人參　甘草　白芍　白朮　當歸

干姜　川芎　茯苓　熟地

右水煎服。連進數帖。方可全愈。

五積散。亦治死胎。皆要藥也。

已上胎前調理。及變生諸症。共二十七條。方數十道。對症用藥。無不靈驗者矣。

■小產門附方二道

夫小產重於大產。將息當過十倍。大產乃栗熟自脫。小產如採生栗。破其皮殼。斷其根帶。非自然耳。蓋胎臟損傷。胞繫腐爛。然後墮胎。豈不過於大產而人多以小產爲輕。以致殞命。大抵小產宜補血生肌肉。養臟氣。生新血。去瘀血爲妙。

補血養眞湯 治小產氣虛下血不止。

人參　黃耆蜜炙　當歸　白朮　白芍酒炒

甘草　阿膠炒　川芎　青皮　香附炒

砂仁各等分　水煎服。

補血定痛湯 治小產瘀血。心腹疼痛。或發熱惡寒等症。

當歸　川芎　白芍酒炒　熟地各一錢

桃仁去皮尖研　紅花　香附　青皮　玄胡索七分

丹皮　烏藥各五分　澤蘭

右劑用水一鍾。入童便老酒各半鍾煎服。

若以手按之腹愈痛者。此是血虛。宜四物湯。參苓白朮。若痛而作瀉。此是脾虛。宜六君子湯加破故紙。炒　肉荳蔻。煨

右劑用姜水煎服。予投之屢試屢驗。

■產育門　附方十三道

夫產育之難者。此由產婦不曾預聞講說生育道理。臨事。愴惶用力失宜。遂有難產之患。是故有逆產者。則先露足。有橫生者。則先露手。坐產者。則先露臀。此皆用力太早之故耳。若當臍腹疼痛之初。兒身纔轉而未順。用力一逼。遂致橫逆。若手先露者。用細針刺兒手心一二分深。三四刺之。以鹽塗其上。輕輕送入。兒得痛驚轉一縮。卽順生矣。或足先露者。謂之踏蓮花生。急以鹽塗兒脚底。又可急搔之。併以鹽摩母腹上。則正矣。偏生者。言兒偏身未順生路。產母努力逼

兒頭偏一偏產難露頂非頂也乃額角耳當令產母仰臥穩婆輕手正其頂向產門却令產母努力子卽下矣凝產者兒已順門路已正兒頭已露因兒轉身臍帶絆其肩以至不能生令產母仰臥穩婆輕推兒向上以中指按兒肩脫出臍帶仍令兒身正順產母努力兒卽生焉腸產者每臨產則子腸先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以酣水各半蓋默然噗產母面背始收也不可不知乃孕家宜預先請穩婆有仁心識見當施恩惠以結其心先與說知倘有生息不順只說未產或遇雙胎只說胎衣不下恐驚則氣散愈難生息余家觀驗之大抵難產多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖胎前清氣產後補血不可專執若脾胃不實氣虛不充宜預調補不然臨產必有患難如因難產停久或遇大寒時節生兒已死急以大油紙燃徐徐燒斷其臍帶或急以火爐銅銚猛煮其胞令煖氣入腹多得復生切不可以刀斷之凡胎衣不下乃母生兒訖敗血

流入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之若緩。脹滿腹中。以至上沖心胸。疼痛喘急。必致危篤。如遇此症。將臍帶急斷之。以物墮住。使其血脉不潮入胞中。則胞衣自當痿縮而下。縱淹延數日。亦不害人。只要產母心懷安泰。不可輕信穩婆妄用手法。多因此而損者。良可嘆息哉。又胞衣不下。因產母元氣衰薄者。用川芎當歸倍桂以温之。亦自下矣。

三合濟生湯　治臨產艱難。雖一二日不下。服此自然轉動生下。

枳壳（麩炒）二錢　香附（炒）一錢　甘草七分　川芎二錢　當歸三錢

蘇葉八分　大腹皮（姜汁炒）一錢

右劑用水二鍾。煎一鍾。待至腰腹痛甚時。通口服之。九月尾。十月頭。先服二三帖。尤妙。

保生無憂散　身居富貴。口食肥甘。無度食飽即臥。令兒肥厚。根帶堅牢。行動色急。不曾預服瘦胎之藥。以致臨產艱難。惟服保生無憂散。易產。

當歸　川芎　芍藥各七分　香附一錢五分　枳殼炒
乳香去油三各分　血餘燒灰一錢五分　甘草三分　共爲末。每服二錢。日進二服。
催生爲全散。黃蜀葵花、不拘多少焙干爲細末。熟湯調下二錢。神妙。或有血漏。胎
臟干澁。難產痛極者。併二三服。良久、腹中氣寬胎滑。卽時產下。如無花。卽用
子研。爛溫酒服之。尤妙。如腹死不下。煎紅花溫酒調下。
治橫生逆產者。其症孕婦欲產。遇腹痛。不肯舒伸行走。仰面而臥。致令兒手先
露。謂之橫生。足先出。謂之逆生。須臾不救。子母俱亡。此方立效。
烏蛇退一條　蟬退十四個　壯血餘一毬胎髮尤妙燒灰存性
右藥各燒灰存性。爲末。每服二錢。酒調下。連進二服。仰臥時片刻卽順。
催生丹。治生理不順。產育艱難。或橫或逆。俱大效。
十二月兎腦去皮膜研如泥　母丁香一錢　麝香一錢另研　明乳香一錢另研

右以兎腦和丸。如芡實大。陰干封固。每服一丸。温酒送下。立產。男左女右。手握丸藥而出矣。必驗。

催生如聖湯　治妊婦欲產。痛陣尚踈。經三兩日不生。或產母氣乏痠頓。產道乾澁。致令產難。纔覺腹痛。但破水後。便可服此藥。卽生矣。胎死亦下。若未經破水者。不宜輕服。

蒼朮　枳殼　桔梗　陳皮　芎藭
白芷　川芎　當歸　肉桂　半夏
甘草　干姜　厚朴　木香　杏仁
茯神

右以姜三片。棗三枚。順流水煎服。方用此芎藭肉桂。能開子宮。餘藥助氣。開竅自通。冬月用之益甚。爲的當。隆暑之時。恐難輕服。但以五苓散。用葵花子

燈心草煎湯送下。御暑清魂滑胎。則易生矣。

催生神應黑散。最治難產。皆因坐草太早。努力過多。兒轉未逮。或已破水。其血必乾。養生方云。倉皇之際。兩命所係。不可不知。此藥之功也。人多不服。以爲極賤之品。大概難產。或一日二日。未免水血先下。如舟在灘。殊不知香白芷百草霜。再固其血。服之如魚得水。決自轉生。兼治月水不調。崩中等症。

香白芷　百草霜　滑石各等分　爲末。川芎湯調下。或加姜汁。

婦人產難。千金不傳。孕婦胎水先破。水干難產。或子死腹中。俱效。

蜜半鍾　香油半鍾　老酒半鍾　三味共一處煎。五七沸。以筯攪之而勻。溫服之。胎氣順。自然分娩無虞矣。

奪命丹。治胎衣不下。爲血所脹。用此逐去衣中之血。胎衣自下。

附子五錢　丹皮一兩　乾漆一兩　大黃末一兩

右藥用醋熬成膏。丸如梧桐子大。溫酒送下。

牛膝湯　治產已出。胎衣不下。臍腹堅脹。急痛甚。及子死腹中。不得出者。皆宜服之。

牛膝酒浸三錢　瞿麥四錢　滑石八錢　當歸六錢　木通六錢　葵子五錢　右劑每服六錢。水煎服。

治血暈血迷欲死者。急取韭菜一大握。切細。放在小口瓶內。用滾熱醋。泡在瓶內。將瓶嘴冲出氣。冲入患人口鼻內。使韭氣直透經絡。血行即活矣。再用後方。或將小鉄稱錘燒紅。淬入醋中。如前法薰之。亦要法也。

清魂散　治產後血迷血暈。此藥大能清血行經。逐舊發新。

澤蘭葉二兩　荆芥穗二兩　川芎一兩　人參五錢　甘草四錢

右爲末。每服二錢　煎葱湯送下。或酒送下。即開眼。

川芎湯。治產後去血過多。血暈不省。

川芎五錢　當歸五錢　荆芥穗五錢炒黑

右作一服。水煎。入酒童便服之。

■產後門 附方六十四道

婦人產畢。飲熱酒童便共一鍾。閉目少坐。上床倚高。立膝仰臥。不時喚醒。及以酸醋塗鼻。或以醋燒炭。或燒漆器。更以手從心下。幹至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血迷血暈。酒雖行血。亦不可多。恐引血入四肢。且能昏迷。宜頻食白粥少許。一月之後。方許食羊肉猪蹄少許。仍愼言語。七情寒暑。梳頭洗足。以百日爲度。若氣血素弱者。不許日月。否則患手足腰腿痿疼等症。名曰蓐勞。最難治療。初問時。不問是男女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷齒。恐致血迷。須氣血平復。方可治

事犯時微染秋毛成病重如山岳可不戒哉

產後毋得令虛當大補氣血爲先雖有雜症以末治之一切病根多是血虛皆可不發表產後不可用苦藥以其酸寒恐伐生發之氣故也產後大發熱必用姜乾輕者用茯苓淡滲其熱一切苦寒并發之藥皆不輕用或曰用干姜者何也曰此非有餘之熱乃陰虛生熱耳故以補陰大劑服之且干姜能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必以補陰藥同用造化自然之妙非天下之至神孰能與於此乎產後脉宜洪數產後脉細小濇弱多死若懷孕者脉主洪數已產而洪數不改者死

產後旬日之內若兒身熱惡寒腹痛惡心嘔吐之類且行瘀血不可便用參芪補劑亦不可用寒涼之藥須用干姜肉桂甚者用附子可也

產後分娩生兒下地覺大小便閉塞不通脹悶難過者因用力過度清氣墜下

故也。

當歸三錢　川芎一錢　升麻三分　柴胡三分

右藥水煎服。升提清氣。氣升遂通。不可用大黃枳殼巴豆之類。以傷脾胃。遂成大患。若數日之後。有他症。而大便閉塞者。因血少而大便燥者。多與生血活血之藥。大便自潤。切不可瀉藥。若產婦無他症。大便閉。四五日。或六七日。此原氣固也。不必過慮。○產後一二日。小便不通。作痛帶赤。宜服

當歸　生地　紅花　白芍　木通

烏藥　澤瀉　川芎　桃仁　茯苓

丹皮　益母草　車前子　加燈草煎服。

產後小便不通。腹脹如鼓。悶亂不省。蓋因未產之前。內積冷氣。產後尿胞運動不順。用鹽於臍中填平。却用葱白剝其粗皮。十一根。作一縛。如

大錢樣。切用一指厚。按臍上。用大柱艾灸之。覺熱氣直入腹中。卽時便通。神效不可俱述。

產後腹痛。當分瘀血與虛痛。將手按之愈疼者。瘀血也。宜破其血。如按實不痛者。虛痛也。宜進補藥。

產後破血。宜丹皮五靈脂桃仁紅花玄胡索。不可用蘇木。恐發暈也。

產後消食積。宜枳殼人參砂仁良姜羅蔔子。禁用山查神麯麥芽。恐發暈也。

產後惡寒發熱。皆是氣血虛症。左手脉不足。補血藥多於補氣藥。右手脉不足。補氣藥多於補血藥。切不可發表。愼之愼之。

產後惡寒發熱。腹痛者。惡血也。如腹滿者。恐非惡血也。宜細詳之。

產後出血過多而痛者。血虛也。養氣補血。爲主其血虛而補氣何也。東垣曰。陽旺能生陰血也。

產後下血不透而作痛者。瘀血也。破血行氣爲主。煎藥必須水與酒各半煎。臨時入童便一盞可也。

產後有瘀血者。如純用破血之藥。不能行血。須破血藥中加行氣之藥。瘀血遂行。如烏藥香附木香之類。

初生子宮懸露七日內。用歸芎湯。少加升麻柴胡各二分。七日外。用參朮歸芎姜桂少加升麻柴胡以提之。卽止。

產後因氣血虛。痰火泛上作暈。二陳湯導痰。氣血虛實。加減用之。

產後頻頻作暈。遍身麻木。手足厥冷。多服參芪歸芎姜桂不效者。此瘀血阻住。不得流通。急用紅花一兩。大黃三四錢。水煎。頻服自效。

產後氣血兩虛。而若中風。身强口眼喎斜。切不可作風治。宜作大虛治。書曰。以氣藥治風則可。以風藥治氣則不可用。

人參一錢　川芎一錢　黃芪八錢　白朮八分　防風二分
烏藥三分　甘草二分　白芷三分　干姜五分　附子五分
肉桂五分　香附五分　陳皮五分

右加姜三斤。棗二枚。水煎服。不拘時。有汗。忌生姜。

產後中風。荊芥爲末。每服三錢。老酒送下。立效。

產後乳母。但覺小水短少。卽時病生。急用服藥。蓋兒吃母乳。母安則兒安。防患於未然。治之善者也。

產後一二日。小腹有塊作痛者。兒枕痛也。宜用

川芎　芍藥　官桂　烏藥　陳皮
良姜各一錢

右用酯一盞。煎五分。空心服。卽消。蓋兒枕。卽子宮也。子宮受傷。故腫而作痛。

見酣。腫卽消縮。遂不痛矣。

初生子。腹疼不止。或十日內身熱惡寒。按實愈痛者。是瘀血。用

川歸　丹皮　桃仁　香附　陳皮

玄胡索　肉桂　千姜　砂仁　紅花

甘草　白芷　川芎

右加姜三片。水酒各一鍾。煎七分。入童便少許服。

產後小腹疼痛。此瘀血作楚。宜服

當歸　川芎　玄胡索　桃仁　紅花

香附子　青皮　澤蘭　丹皮

右水酒各半煎。入童便服。

卷荷散。治產後惡血不快。血上沖心刺痛。血暈等症。

丹皮五分　初出卷荷一錢　紅花　當歸　蒲黃炒

右藥共爲末。每服三錢。溫酒入童便調下。

舒眉散。治血刺痛。五靈脂一兩　蒲黃一兩　麝香一錢

共爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三十丸。酣湯下。

產後但見輕可。身熱不退。而無他症者用

川歸　川芎　干姜　白朮　白茯苓

右劑加姜棗水煎。不拘時候服。

四物和眞湯。治產後血虛發熱用

川芎　當歸　芍藥　生地　白朮

陳皮　香附　干姜　炙甘草

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎。空心服。

如胸膈飽悶。加砂仁、枳殼、山查、厚朴。如兩脇痛。加青皮、肉桂。如小腹陣痛。加玄胡索、桃仁、紅花、蘇木。如有汗。加黃蓍。如口乾。加麥冬。

醒脾湯。治產後停食。胸膈胞悶。身發寒熱。不思飲食者。用

陳皮　厚朴　甘草　神麴　砂仁

枳實　干姜　麥芽　蒼朮

水二鍾。姜三片。煎服。

如大便泄瀉。加白朮茯苓。　如大便閉結。加桃仁枳殼。　如小便不通。加大腹皮。

萬金湯。治產後發熱。無分瘀血積食。俱可服之。此代代相承之秘傳也。珍之。

珍之。

肉桂　陳皮　干姜　當歸　茯苓

枳殼　甘草　厚朴　半夏　桔梗
白芷　芍藥　蒼朮　川芎　麥芽
山查　烏藥　香附
加姜三片。水煎。入酒便。隨症加減服之。

產後血塊痛。加蘇木。臨服時。加米酣半盞。如遍身痛。亦加前二味煎服之。倘泄瀉。去枳殼、加肉果、木香、訶子。如產後渾身壯熱。重加干姜。如腹痛甚者。加桃仁、紅花、玄胡索、三稜、蓬莪朮。或血塊血枕痛。加前味可也。如四肢腫痛。加牛膝、乳香、沒藥。如遍身腫浮。加大腹皮（酒炒）桃仁、沒藥、蓬朮、玄胡索。倘惡露過多不止。加藕本、干姜、香附（俱炒黑）若狂言亂語。詞笑謳唱。加砂仁末五分。投藥汁沖。

產後十日之外。惡寒身熱。發戰嘔吐。汗出腹痛。以手按之而不痛者。大虛也。宜

用

當歸　人參　黃芪　杜仲　陳皮各一錢

白芷　甘草各三分　白朮　官桂各七分　香附五分

干姜八分　加姜棗煎服。

如泄瀉。加蓮肉七個　肉果五分　砂仁三分

如大熱、大汗。大戰者。大虛、大寒、也。加附子五分　沉香一錢

如按實愈痛者。屬虛。更有瘀血。加丹皮、桃仁、紅花、玄胡各一錢

壯氣丸。　治產後惡心。

白朮　干姜　半夏　當歸　桂心

萱仁　丁香各五分　甘草二錢五分

右爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五六七丸。酯湯下。

產後宿食。腹痛身熱。右手關脉沉滑有力者是也。不可用此承氣湯。巴豆丸。須於補藥中加消食之劑。其食自行矣。

萊菔子炒　人參　良姜　砂仁
陳皮　山查　甘草

右劑用姜三片。水煎服。立愈。

醒脾湯　治症藥料及加減。俱載在前。

產後脾胃虛寒泄瀉用

人參　白朮　陳皮　白茯苓　蓮肉
甘草　砂仁　乾姜　加姜棗煎服。爲驗極神。

如極虛者。加附子。　如氣大陷者。加升麻柴胡。

產後虛寒。泄瀉不止者。用

米仁炒　干姜煨　人參　砂仁　白茯苓

白朮　蓮子各一兩　陳皮　山藥各一錢　甘草炙八分

右共爲末。米糊爲丸。如梧子大。每服八十丸。食遠米湯送下。

產後脾胃虛寒。飲食不節。或多脾泄之症。用

香附米泔浸一宿控干炒四兩　砂仁微炒二兩　干姜炒紫二兩

右爲末。老酒米糊丸。空心米湯下八十丸。

的奇散。治產後泄瀉。惡露不行。此瘀血滲入大腸。爲瀉。分過則愈。雖洞泄不禁。下青黑色物亦驗。

大荊芥四五穗。於蓋內燒成灰。存性不得犯油氣。入麝香少許。煎沸湯。二三呷調下。此藥雖微。能愈大病。毋忽。

產後痢疾。量情調氣。健脾養血。不可妄下。及輕用寒涼之藥。宜

當歸　陳皮　黃連酒炒八分　白朮　蓮子七個

木香　人參　甘草　加姜三片棗二枚煎服。

產後瘧疾。以滋補氣爲急。不可用常山草果等藥。

人參　當歸　川芎　茯苓　甘草

山查　白朮　陳皮　柴胡　半夏

加姜棗煎服。

產後手足風痛者。產後風也。氣血兩虛。于補藥內加風藥少許。

人參　桑寄生　牛膝　白朮　秦艽

川芎各七錢　川歸　紅花　續斷　黃蓍各一錢

官桂　白芷各五分　陳皮　獨活　甘草

干姜各四分

右用姜棗水煎服。四五日有熱者。去姜桂加芍藥。

產後手足痛者。外服溫補之藥不愈者。四物湯。二陳湯。黃柏　白芷稍之

右用姜水煎。空心服。四五服。全愈。不可執產後不用寒凉之藥說。最宜權變。

產後瘀血流入經絡。瘀血流入成癰腫。臍下成塊。自小漸大者。或產難。因穩婆接生。指甲悞傷經絡。瘀血流入成癰。凝結是也。並服補藥。加行血之藥。小便腹角。皮外高凸處。以碗磁鋒量情仔細刺出膿水。尤爲要法。嗣後可得垂愈。

人參　當歸　山查　黃芪各一錢　川山甲五分

官桂五分　白芷五分　香附八分　丹皮七分　甘草六分

加姜棗水煎。入琥珀末三分。

產後淋瀝不已。或產難。穩婆接生。傷損膀胱故也。用

人參二錢　黃芪　合歡皮　川歸　甘草

白斂　干姜　右劑加姜棗水煎。空心服。

產後日久。人虛氣喘。或服湯藥過多而發喘者。用

人參　砂仁　枳實　桔梗　貝母
茯苓　杏仁　干姜　香附　當歸
核桃肉一個　水煎服

產後不謹。沐浴太早。湯氣入腹。腹滿氣喘等症。或火炙。而火氣入腹內脹喘。宜用行氣解毒之藥。宜

川芎　當歸　厚朴　砂仁　烏藥
防風　香附　桔梗　茯苓

右劑用姜三片。水煎服。

推腸生子。子脹受風。風入腹內。不得其位。一日死去三五次。用

牛黃七分　防風　眞珠一錢　辰砂三錢　共爲細末。將升麻柴胡川芎石菖蒲煎湯。送前藥末入口。一日下四五服。卽愈。

產後不語者。乃氣血虛弱。停積敗血。閉其心竅。神志不定。不能明省。又心氣過於舌。心虛閉寒。舌强矣。故令不語也。宜

北細辛　防風各三分　川芎　人參各五分　石菖蒲一錢

生地五分　辰砂五分另研　右藥共爲末。薄荷湯送下。

產後諸症。不能言語者。宜服

神仙解毒丹。　茯苓　遠志　全蝎　姜蠶

羌活　防風　荊芥各一錢　胆星二錢　石菖蒲二錢

漢防己八分

右爲末。麵糊爲丸。辰砂爲衣。薄荷湯送下。五十丸。

產後敗血冲心。發熱狂言。奔走脉虛大者。

乾荷葉一張　生地　丹皮各等分

右三味濃煎服。調蒲黃末二錢。一服卽定。

牛黃膏。治熱入血室。發狂不省人事。

牛黃二錢五分　辰砂三錢　鬱金三錢　磁砂一錢　甘草一錢

丹皮三錢　右爲末。煉蜜爲丸。如皂子大。新汲井水化下。

鎭心散。治產後心氣虛損。卒驚狂語。或歌笑嗔笑。罵詈。性氣不足。因虛弱發爲風痙者。

桂心　甘草　細辛　人參　干姜

生地　茯神　遠志　歸身　川芎

防風　辰砂一分另研投藥汁中

右用紋銀十兩。水二碗半。煎至一碗半。入藥。煎至七分。後入辰砂末調勻。空心溫服。渣再煎。如前法。

治婦人一切癲狂失志。屢服有效。

茯神　棗仁炒　遠志炒　麥冬　陳皮
甘草　半夏　沙參　當歸　香附
黃芩　貝母　芍藥　山梔　生地姜炒

右水一鍾半。姜三片。煎七分。臨好時。入竹瀝半鍾。姜汁三匙。再磨沉香一分服。如食不下。加砂仁五分。如發熱。加柴胡五分。如嘔。加藿香五分

治一切癲症主方。茯神　黃芩　甘草　半夏　天花粉
貝母　黃連　山梔　遠志
當歸　牛黃一分另研　辰砂一錢另研

右姜三片。入竹瀝一盞。姜汁少許。和服。如火盛。加童便一盞。

黃耆湯。治產後虛汗不止。因陰虛而得。又遇風邪所搏。發爲此疾。如兩手拭

不及者。不治。

黃芪　白朮　防風　熟地　牡蠣
白茯苓　麥冬　右劑加紅棗三枚。水煎服。

又方。

人參　黃芪　白朮　白茯苓
麻黃根　牡蠣

右童子母雞一隻。修理潔淨。水六七碗。同前藥煎三碗。服之。封臍膏。治同上。五倍子。不拘多少。爲末。津吐調勻。塡臍內。封固。用綿縛之。

治產後遍身虛腫的驗方。

當歸　干姜　厚朴　知母
紅花　砂仁　五味　烏梅
貝母　白芷　香附　川芎鹽水泡

右劑加姜三片。酒二小鍾。煎服。

產後浮腫。加味四物湯。

當歸　川芎　芍藥　熟地　郁李仁
白朮　丁香　桑皮　甘草　赤苓
陳皮　香附子　水煎服。

奪魄散。治產後虛腫喘促。利小便。

生姜二兩　白麵三兩　半夏七斤

右以姜汁和麵。裹半夏。爲七個餅。炙焦熟。研末。調服。利小便甚妙。

產育艱難。或一歲一產。可以此藥小間之。名疎胎丸。

四物湯。加雲苓子一撮。卽君達子也。天蘿子亦可。

右藥以水煎。於經行之後。第四日服起。四日卽止。服必空心。可以疎胎。此蓋

爲多子多怨者設耳切勿妄投。

加味升麻葛根湯。治法同上。升麻　葛根　芍藥　甘草各一兩　瞿麥　土牛膝　括蔞根　豆豉炒各一錢

爲散。分作八服。空心服。亦于經行後便服。一日二服。渣合煎。每服亦加雲苓子爲妙。

又方棕梠子散。同上治。棕梠子炒過不拘多少爲末。于經行後。空心服二三錢。白滾湯下。日進一服。四日止。

治婦人絕產不生子方。

小青萍一兩　水銀一兩　虎鬚五錢　天花粉一兩　地骨皮一兩　歸尾一兩

共爲細末。麵糊爲丸。梧子大。砂仁爲衣。臨經行。服五日。每服一日。吞下九十丸。三個月。卽終絕產矣。

又方永絕不產子。玄胡　丹皮　鬼箭　姜黃　蘇木　紅花　朴硝　右將蠶退紙一張。卽蠶出過殼。燒灰存性。共和爲末。溫酒下二錢。常服于經行後。終身無孕矣。

■乳病門附方七道

乳汁不通。結核成餅。不散。寒熱作痛者。速揉散。乳汁一通。餅核自消。如不消。結成乳癰。急用連鬚葱。搗成餅。貼乳上。用炭火一罐。蓋葱上熨之。須臾汗出。立消。玉露散。治產後乳汁不行。身體壯熱。頭目昏痛。大便澁滯。悉能治之。凉膈壓熱下乳。

人參　白茯苓　甘草炙五分　桔梗炒　川芎　白芷各一兩　當歸三錢　芍藥七錢

右每服五錢。水煎服。如煩熱。大便祕結。加大黃。

瓜蔞散。治乳疽、乳癰、奶勞。此乳病第一方。

黃瓜蔞一個子多者不去皮焙研爛　當歸五錢　乳香一錢　沒藥一錢

甘草五分

右合成一劑。好酒三碗。於銀石器內。熬至一碗半。須慢火熬。當分爲三次。食後服。如有乳勞。服此藥。杜絕病根。如毒氣已成。能化膿爲黃水。毒未成。卽內消矣。疾甚者。再合一丸。以愈爲度。

乳汁不通。人壯、實者。宜

桔梗二錢　瞿麥一錢　柴胡一錢　天花粉一錢　赤芍藥五分

連翹五分　甘草五分　水煎頻服。更摩乳房。

乳汁不通。人虛者。宜

王不留行　木通　天花粉　當歸　川芎

白芍藥炒　生地各等分

右用猪蹄傍肉四兩。煎湯一碗。入藥同煎。服。先將白滾湯頻洗乳房。

湧泉散。治乳汁不通。

王不留行　天花粉　甘草各三錢　當歸　川山甲酥炙各五錢

右爲末。每服三錢。猪蹄湯。或熟酒調下。其乳自通。

乳癰發痛者。血脉滯注不散也。宜

天花粉　金銀花　皂角刺　川山甲土炒　歸尾

白芷稍　貝母　瓜蔞仁　甘草節

共以酒煎服。此方治吹乳。乳癰。腫不可忍者。立効。

又方。白芷三錢　半夏三錢　加姜酒煎服。立愈。

婦人血氣方盛。乳房作脹。或無兒飲。脹痛。憎寒發熱。用

大麥芽二三兩炒熟　水煎服。立消。此乳兒已亡。不用乳者則可。

■乳岩門附方一道

婦人乳岩。始有核。腫如鷰。棋子大。不痛不痒。五七年。方成癌。初便宜多服疎氣行血之藥。須情思如意則可愈。如成之後。則如岩穴之凹。或如人口有唇。赤汁濃水。浸淫胸腹。氣攻疼痛。用五灰膏去蟲。因生新血。漸漸收斂。此痰火生於憂抱積忿。中年婦人未破者。尙可治。若成瘡。終不可治。蓋不治。適得其天年。治之乃所以速其死也。用服十六味流氣飲。治之於早。可也。

十六味流氣飲　治乳岩第一方。

當歸　川芎　白芷　白芍藥　黃蓍
人參　上官桂　厚朴　桔梗　枳殼
烏藥　木香　梹榔　防風　紫蘇

甘草　右水煎。食後臨臥頻服。乳癰加青皮。

■婦人諸病門 附方八道

婦人與鬼交通者。臟腑虛神不守。故鬼氣得而爲病也。其狀如不欲見人。若有對語時。或獨言笑。或悲泣者。皆是也。其脉息遲伏。或爲雀啄。皆鬼邪爲病也。又脉來綿綿不知度數。而顏色不變。此亦是死候也。

鬼哭穴。以患人兩手拇指相並。用綿緊扎。當合縫處。半肉甲間。半灼艾炙七壯。若果邪祟病者。卽乞求免云。灸之。我自去矣。

茯神散。治婦人氣虛。與鬼交通。妄有見聞。言語錯亂。

白茯苓一錢五分　白茯神去木　人參　石菖蒲各一錢　赤小豆五分

秘傳方薰藥開後。松脂三兩炒于另研　雄黃一兩另研

右二味爲末。熔化。爲安息和丸。用虎爪和均。如彈子大。下用火爐燒藥熏之。